



20 DE ABRIL 2021

DOCUMENTO DE ASESORAMIENTO  
ANUAL EN GESTIÓN INTEGRADA DE  
PLAGAS EN ZONAS VERDES Y  
AJARDINADAS DE RIVAS VACIAMADRID

Nº DOCUMENTO: 01/21

ÉRICA VALIENTE ORIOL  
Nº Inscripción ROPO: 132800450SA

## Contenido

DATOS GENERALES .....	3
DATOS DEL INTERESADO .....	3
DATOS DEL ASESOR.....	3
ÁMBITO DE APLICACIÓN .....	3
DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS VERDES .....	3
ESPECIES VEGETALES EXISTENTES.....	11
DESCRIPCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS.....	13
1. PULGÓN .....	16
1. PROCESIONARIA DEL PINO .....	21
2. GALERUCA.....	25
3. BARRENILLO DEL PINO .....	29
4. PSILA DEL CERCIS .....	32
5. TIGRE DEL PLÁTANO.....	35
6. ORUGA PERFORADORA DE LOS CHOPOS.....	38
7. ESCOLÍTIDO DEL OLMO .....	41
8. ARAÑA ROJA.....	44
9. ORUGA DEFOLIADORA DEL ATRIPLEX.....	47
10. XYLELLA FASTIDIOSA.....	49
11. BACTERIOSIS ELEAGNUS.....	51
12. CHINCHE DEL PLÁTANO .....	53
13. COCHINILLA ALGODONOSA .....	56
14. ORUGA DE LA RETAMA.....	59
15. FUEGO BACTERIANO .....	61
16. FITÓFTORA.....	63

17.	ROYA.....	65
18.	ANTRACNOSIS DEL PLÁTANO.....	67
19.	OIDIO.....	70
	CONDICIONAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS EN ZONAS VERDES. ....	73
	EXISTENCIA DE GRUPOS VULNERABLES. ....	76
	PRESENCIA DE CURSOS DE AGUA Y DE POZOS.....	77
	VALORACIÓN DE LOS RIESGOS INHERENTES A LOS TRATAMIENTOS .....	79
	MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA LOS OPERARIOS.....	79
	NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE .....	80

## **DATOS GENERALES**

### **DATOS DEL INTERESADO**

RAZÓN SOCIAL: RIVAS-VACIAMADRID, E.M.S., S.A.  
DIRECCIÓN: C/ MARIANO FORTUNY, 2 – RIVAS VACIAMADRID  
PERSONA DE CONTACTO: CARLOS HERNANDO PÉREZ  
TELÉFONO: 696 921 356  
CORREO ELECTRÓNICO: [jardineria@rivamadrid.es](mailto:jardineria@rivamadrid.es)

### **DATOS DEL ASESOR**

NOMBRE: ÉRICA VALIENTE ORIOL  
Nº INSCRIPCIÓN ROPO: 132800450SA  
TELÉFONO: 626 201 579  
CORREO ELECTRÓNICO: [produccion.pyj@rivamadrid.es](mailto:produccion.pyj@rivamadrid.es)

### **ÁMBITO DE APLICACIÓN**

El presente Documento de Asesoramiento es de aplicación a todas aquellas zonas verdes de titularidad municipal del municipio de Rivas Vaciamadrid, así como a una serie de superficies verdes privadas, de uso público y privado que se detallarán en el apartado correspondiente.

### **DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS VERDES**

Se procede a enumerar las zonas verdes, codificadas, en función de la superficie y la utilidad:

**ZONAS VERDES DE SUPERFICIE < 1000 m<sup>2</sup>**

<b>Cód</b>	<b>Definición</b>	<b>Sup.</b>
40	Rot. Covibar/García Márquez triáng.	618,00
41	Rot. col. El Olivar: triángulo y fuente	743,00
42	Rot. Avda. Covibar / Deporte	159,00
44	Glorieta Avda. Parque frente 3ª edad	62,00
45	Glorieta Miguel Hdez./Cantabria y tr.	173,00
46	Glorieta Miguel Hdez/estación/triang.	367,00
117	Rot. Abogados Atocha / Covibar	129,00
118	Escultura Junkal con Acacias	459,00
36 37 38	Aparcamientos Pablo Iglesias (Copima, Diana y Enseñanza).	230,00
4	Avda. Levante (Desde Italia a Mirador) medianas y rotondas	4.634,00
5	Pza. Consistorial/19 de Abril	202,00
6	C/ Grupo escolar	100,00
7	Marcial Lalanda	97,00
75	Rotonda Campillo San Isidro/Francia	714,00
76	Rotonda Campillo San Isidro/Mirador	700,00
77	Mediana Campillo San Isidro	980,00
103	Entrada Piscina municipal Casco	79,00
159	Plazoleta cruce Avda de Aurelio Álvarez esquina Avenida de Levante nº 187	5.575,00
123b	Ambito 2 Avenida de Levante de C/ Italia a 12 olivos	7.375,00
131b	Parque Sureste	450,00
64	Arriate frontal Poli. Parque Sureste	552,00
54	Recinto Multifuncional	271,00
65	Centro IFIE	345,00
66	Glorieta Rotondas Tenencia	532,00
136	Jardines Protección Civil	164,00
137	Rotonda y triángulos entre AUDITORIO Pilar Bardem y Polidep. C. Telégrafo	801,00
148	Punto limpio Severo Ochoa	630,00
149	Punto limpio Fundición	351,00
152	Centro de Contenidos Digitales	68,00
154	Nave de mantenimiento	131,00
141a	Sector 8 Rivas Futura (rotondas y medianas)	29.553,00
priv06	Com. Prop. Avenida de Velázquez, 5	221,17
58	Encina verde y triángulos	247,00
59	Moreras	160,00
135	C/ Enebro x Duratón, aparcamiento	288,00
43	Rotondas Deporte, Ferrocarril, estación junto ferrocarril y Abogados de Atocha	541,00
50	Pza. Madroños	454,00
51	Glorieta Opera	728,00
52	Glorieta Río Jarama	693,00
63	Rotonda Covibar 2 - Avda. Los Almendros con Pº Provincias (fuente)	540,00
116	Rotonda y mediana Almendros/ Picos de Urbión	702,00
23a	Aigües Tortes (deportes)	802,00
90	Medianas de Pablo Iglesias	8.622,00
91	Plazas Zarzamora	909,00
92	Arándano	668,00
93	Margarita	897,00
94	Beleño	670,00
95	Jara	567,00
96	Canela	667,00
97	Malva	674,00
98	Lavanda	577,00
99	Plazas Menta	666,00
100	Musgo	567,00
101	Tomillo	571,00
102	Romero	666,00
120	Bienestar Social (Santa Mónica)	862,00
122	Rotonda Palestina (Ramón y Cajal con César Manrique)	196,00
127a	Sector 3 Procorsa, Rotondas y medianas	985,00
90a	Glorietas y medianas Ramón y Cajal y Angel Saavedra	5.361,00
priv03	Empresa Municipal de la Vivienda	690,00

<b>ZONAS VERDES DE SUPERFICIE 1.000&lt;x&lt;10.000</b>		
<b>Cód</b>	<b>Definición</b>	<b>Sup.</b>
55	Talud Avda. Covibar	6.792,00
priv05	Piscina PABLO IGLESIAS	3.012,54
1	Parques San Isidro	9.110,00
2	Cigüeñas	3.750,00
3	Europa	4.953,00
8	Dinamarca	3.797,00
9	Reino Unido	3.731,00
10	Mirador	7.579,00
12	Cementerio Municipal (interior)	2.689,00
68	Franja C/ Lago Garda	8.420,00
72	Campillo entre Lago Garda y C/ Mirador.	12.565,00
78	Mediana y rotondas Francia	2.704,00
108	GEDECO- todas	15.807,00
123a	Ambito 2 zv Manuel Boix y zv Juan Genovés	7.602,00
132c	Piscina San Isidro	1.574,00
4A	Avda. Levante (Desde Italia a Mirador) parque	4.858,00
19	Casa de la Música	1.186,00
34	Jardines Centro de Empresas	1.198,00
35	Pza. y aparcamientos Tenencia.	7.713,00
144	Plaza Ecópolis	6.260,00
155	Sede Rivamadrid	1.476,00
priv02	Decathlon Rivas	4.819,00
56	Eucaliptus 100	2.699,00
57	Eucaliptus 34	1.939,00
104	Lateral Cerro Telegrafo	5.044,00
16	Parque La Partija (Zoco Rivas)	4.677,00
23	Aigües Tortes	1.609,00
24	Almendros (Urbanización y parque Avda Los Almendros)	6.247,00
29	Arboreto y canchas deportivas colindantes	4.679,00
39	12 Plazas Covibar II	7.494,00
67	CERPA	2.228,00
115	Avda.Provincias con Gijón	2.797,00
134	Medianería y rotondas de Avenida de las Provincias	2.247,00
150	Zona ajardinada Barrio La Fortuna	7.358,00
151	Glorietas Barrio La Fortuna	1.210,00
156	Ensanche Cristo de Rivas fase 2	5.113,00
160	Parque parcela 6 Océano Pacífico	7.054,00
161	Medianas y Glorietas bajada a Cristo Rivas	3.245,00
131d	Piscina La Partija	3.076,00
28h	Talud Avda. Los Almendros (Provincias - P. Urbión)	6.133,00
15	Santa Mónica	6.177,00
79	Ramón y Cajal desde glorieta Palestina hasta Avda. Cerro Telégrafo	9.481,00
82	Ramón y Cajal (Entre La Vid y Jovellanos)	7.444,00
83	Ramón y Cajal/Vid	6.666,00
84	Parque La Vid	9.937,00
88	Glorieta Ramón y Cajal - IES Europa	1.311,00
89	Rotondas Avda. Pablo Iglesias (5).	2.900,00
114	Rotonda y franja lateral Cerro Telégrafo con Haya	2.131,00
121	Capaneira/Girasol	7.251,00
126	Rotondas Pilar Miró (2)	3.903,00
133	Parcela de Policía Municipal	1.186,00
140	Pablo Iglesias 87	1.508,00
124a	Ambito 3 (de Saramago a Jorge Guillén)	20.505,00
124b	Ambito 3 (de Jorge Guillén a Jovellanos)	23.123,00
28a	Glorieta y medianas de entrada (por urbanizaciones)	5.278,00

<b>ZONAS VERDES DE SUPERFICIE 1.000&lt;x&lt;10.000</b>		
<b>Cód</b>	<b>Definición</b>	<b>Sup.</b>
22	Parque Encuentro	39.488,00
13a	Parque Asturias (incl. Reloj de Sol y Monolito)	62.544,00
14a	Montarco	56.326,00
11	Miralrío	35.015,00
69	Campillo entre Fernandez de los Rios y Lago Garda	13.079,00
107	L7 Mirador	10.952,00
123	Ambito 2 (Avda. Juan Carlos. I, Mediana y zv Manuel Azaña)	28.557,00
128	Casa Grande	13.374,00
132	Cementerio Exterior	23.201,00
142a	Auditorio Miguel Rios (jardines norte)	93.486,00
142b	Auditorio Miguel Rios (jardines sur)	31.288,00
141	Sector 8 Rivasfutura (parques)	39.466,00
17	Barca Vieja	18.971,00
26	Parque Lineal I (avda. Provincias) talud	27.013,00
27	Parque Lineal II (avda. Provincias)	26.098,00
138	Parque lineal metro urb.	61.903,00
145	Masas arbustivas Avenida de Los Almendros - Hipatia	10.542,00
146	Parque y terrizo frente a Hipatia	15.462,00
147	Bulevar y taludes barrio E.M.V. La Luna	30.143,00
145a	Masas arbustivas calle Mar Mediterraneo	13.173,00
28f	Avda. Los Almendros (Integración-Zarzuela)	62.777,00
priv04	Piscina COVIBAR	13.451,00
81	Ramón y Cajal con José Saramago	16.418,00
87	Dalia	12.894,00
105	Tejo/Trébol	14.657,00
127	Parque Jovellanos (biblioteca central) y Franja Miguel Gila	40.692,00
143	Parque lineal Angel Saavedra	22.692,00
106a	Parque Bellavista zigurat	30.497,00
106b	Parque Bellavista escaleras	18.774,00
106c	Parque Bellavista rosaleda	19.306,00
106d	Parque Bellavista cantón	21.197,00
124c	Ambito 3 (de Jovellanos a Gonzalo Torrente Ballester)	27.425,00
131a	Polideportivo Cerro del Telégrafo	27.125,00

### ZONAS VERDES DE CENTROS EDUCATIVOS

<b>Cód</b>	<b>Definición</b>	<b>Sup.</b>
cp01	CEIP La Escuela	5.018,00
cp02	CEIP El parque	5.927,00
cp03	CEIP El olivar	4.005,00
cp04	CEIP Mario Benedetti	13.122,00
cp05	CEIP Rafael Alberti	7.852,00
cp06	CEIP Los Almendros	4.614,00
cp07	CEIP Victoria Kent	3.188,00
cp08	CEIP Jarama	4.930,00
cp09	CEIP Jose Saramago	4.494,00
cp10	CEIP José Hierro	6.448,00
cp11	CEIP Hans Christian Andersen	2.351,00
cp12	CEIP Dulce Chacón	5.350,00
cp13	CEIP Las Cigueñas	6.473,00
cp14	CEIP Jose Iturzaeta	2.936,00

### ZONAS VERDES FORESTALES

<b>Cód</b>	<b>Definición</b>	<b>Sup.</b>
13b	Asturias forestal	18.023,00
14b	Montarco forestal	10.507,00
142f	Auditorio Miguel Rios (forestal)	108.229,00
129	Mazalmdrit (Parque forestal)	780.000,00
130	Mazalmdrit (Senda Botánica)	7.658,00
157	Zona forestal Arroyo de los Migueles	3.500.000,00

### JARDINERAS

<b>Cód</b>	<b>Definición</b>	<b>Uds.</b>
jj09	Jardineras Polideportivo Parque del Sureste	31,00
jj01	Jardineras Alcaldía	84,00
jj02	Jardineras Centro Cultural Federico García Lorca	45,00
jj03	Jardineras Concejalía de Mantenimiento Urbano	10,00
jj04	Jardineras Centro de Empresas	14,00
jj05	Jardineras I.F.I.E.	17,00
jj07	Jardineras Sede Rivamadrid	33,00
jj06	Jardineras CERPA	12,00
jj08	Jardineras E.M.V.	32,00



## ZONAS VERDES EN SUELO RESIDENCIAL PRIVADO DE USO PÚBLICO

Cód	Definición	Uds.
18	* Folklore	4.659,00
20	* Copima	7.400,00
21	* Rayuela	3.773,00
M02(2)	Covibar (Pau Casals y Pablo Picasso)	3.948,73
M02(3)	Covibar (Violeta Parra)	3.988,55
M02(4)	Covibar (Fco. G <sup>a</sup> Lorca, Antonio Machado y Rafael Alberti)	5.389,54
M04	Las Autonomías	5.062,00
M08	Monte Ciruelo	221,17
M09	Naranjo de Bulnes	2.245,19
M10	Moro Almazor	2.906,98
M11	COVIBAR MADRID	24.238,75
M13	Centro Cívico COVIBAR	4.190,07
M14	Pablo Iglesias P-1 hasta P-10	5.062,00
M01	Ronda de Oviedo	3.951,07
M02(1)	Covibar (Plazas Pablo Neruda, Miguel Hernandez, Blas de Otero y León Felipe)	6.199,91
M03	Manzana 2-3	4.190,07
M05	Unidad 412	4.819,00
M06	Prineos-Blimea	13.451,00
M07	Valle del Nalón	3.012,54
M12	CUENCA A y CUENCA B	4.331,60

## OLIVAR

Cód	Definición	Uds.
61	El Olivar Partija (Alto y Bajo)	143.316,00

PARQUES INFANTILES			PARQUES INFANTILES		
Cód	Definición	Uds.	Cód	Definición	Uds.
im01	Parque infantil Dolores Ibarruri I	150,00	im06	Parque infantil Ronda de Oviedo I	336,00
im03	Parque infantil Dolores Ibarruri III	192,00	im07	Parque infantil Plaza Blas de Otero	166,00
im04	Parque infantil Plaza Federico García Lorca	300,00	im08	Parque infantil Plaza Miguel Hernandez	478,00
im05	Parque infantil Plaza Rafael Alberti	375,00	im09	Parque infantil Plaza de Aragón	239,00
im10	Parque infantil Plaza de Cataluña	199,00	im13	Parque infantil Plaza Bimea	173,00
im11	Parque infantil Plaza Castela	397,00	im14	Parque infantil Plaza Madrid	340,00
im16	Parque infantil Plaza de Monte Ciruelo	60,00	pi01	Parque infantil Avda. de los Almendros I	311,00
im17	Parque infantil Pau Casals (Frente a Cantón del Parque de Asturias)	244,00	pi02	Parque infantil Avda. de los Almendros II	201,00
im19	Parque infantil La Regenta, (Portal 7)	216,00	pi04	Parque infantil Zoco Rivas	193,00
im20	Parque infantil Blas Infante (Portal 11)	284,00	pi05	Parque infantil Parque de los Almendros	206,00
im21	Parque infantil Antonio Machado	225,00	pi06	Parque infantil Parque Cazorla (Almendros)	160,00
pi11	Parque infantil Parque Asturias	1.060,00	pi09	Parque infantil Avda. de las Provincias	266,00
pi12	Parque infantil Parque Montarco	345,00	pi10	Parque infantil Olivar Bajo	140,00
pi13	Parque infantil Encuentro I	204,00	pi55	Parques infantiles Parque lineal metro urb. y Aspadir	1.917,00
pi14	Parque infantil Encuentro II	141,00	pi63	Parque infantil Parque infantil Bº Fortuna/ Víctimas del terrorismo	378,00
pi15	Parque infantil COPIMA	266,00	pi64	Parque infantil Bulevar BMW I	137,00
pi16	Parque infantil Folklore	152,00	pi65	Parque infantil Bulevar BMW II	118,00
pi17	Parque infantil Rayuela I	0,00	pi66	Parque infantil Bulevar BMW III	100,00
pi70	Parque infantil Rayuela II	48,00	pi67	Parque infantil Bulevar BMW IV	93,00
pi18	Parque infantil San Isidro	150,00	pi71	Parque infantil Parcela 6 Océano Ártico	389,00
pi19	Parque infantil Miralrío	268,00	pi72	Parque infantil Parcela 10 frente Hypatia I	100,00
pi20	Parque infantil Mirador	96,00	pi73	Parque infantil Parcela 10 frente Hypatia II	100,00
pi21	Parque infantil Dinamarca	88,00	im02	Parque infantil Ronda de Oviedo II	50,00
pi22	Parque infantil Cigüeñas	368,00	pi03	Parque infantil Santa Mónica	249,00
pi23	Parque infantil Europa	306,00	pi39	Parque infantil Bellavista I	764,00
pi24	Parque infantil Lago Garda	405,00	pi40	Parque infantil Bellavista II	606,00
pi25	Parque infantil Campillo I	110,00	pi41	Parque infantil José Saramago	297,00
pi26	Parque infantil Campillo II	240,00	pi42	Parque infantil Capa Negra I	156,00
pi27	Parque infantil Gedeco	224,00	pi43	Parque infantil Capa Negra II	111,00
pi28	Parque infantil Juan Carlos 1º I	600,00	pi44	Parque infantil Policía	229,00
pi29	Parque infantil Juan Carlos 1º II	220,00	pi45	Parque infantil EM/	360,00
pi30	Parque infantil Juan Carlos 1º III	490,00	pi46	Parque infantil Clara Sánchez	180,00
pi31	Parque infantil Manuel Azaña (para mayores)	750,00	pi47	Parque infantil Miguel Gila I	393,00
pi32	Parque infantil Exterior del Cementerio I	1.032,00	pi48	Parque infantil Miguel Gila II	36,00
pi33	Parque infantil Exterior del Cementerio II	629,00	pi49	Parque infantil Fernando Trueba	640,00
pi34	Parque infantil Sebastiao Salgado	148,00	pi50	Parque infantil La Vid	260,00
pi35	Parque infantil Juan Genovés	126,00	pi51	Parque infantil Dalia	180,00
pi36	Parque infantil Reino Unido	100,00	pi52	Parque infantil Tejo	124,00
pi37	Parque infantil Casa Grande	224,00	pi53	Parque infantil Jovellanos I	114,00
pi38	Parque infantil Pista frontón	66,00	pi54	Parque infantil Jovellanos II	112,00
im22	P. Infantil Plazoleta cruce Avda de A. Álvarez esquina Avenida de Levante nº 187	154,00	pi68	Parque infantil Ana María Matute	144,00
pi07	Parque infantil Barca Vieja I	134,00	pi69	Parque infantil Pilar Miró (Mazaladrá)	180,00
pi08	Parque infantil Barca Vieja II	204,00	pi74	Parque infantil Polideportivo Cerro del Telégrafo I	377,00
			pi75	Parque infantil Polideportivo Cerro del Telégrafo II	180,00

TERRIZOS		
Cód	Definición	Uds.
tr35	Zona terriza entrada a Urbanizaciones	2.138,00
tr06	Zona terriza C/ Grecia, 14D	2.525,00
tr07	Zona terriza C/ Marcial Lalanda, 105D	1.793,00
tr08	Zona terriza C/ Monaco, s/n	2.543,00
tr09	Zona terriza C/ Suiza, 19D	1.745,00
tr58	Terrizo metro rivas futura (zona Jaime)	36.687,00
158	Parque talud Joaquin Sorolla	3.125,00
tr02	Zona terriza Parcela entre Cerro Telégrafo y LUYFE	12.202,00
tr03	Zona terriza entre calles Cadiz, Sevilla y P. Urbion	12.478,00
tr05	Zona terriza C/ Mirador, s/n	819,00
tr10	Zona terriza C/ Fernando Trueba, 2 y 9	20.291,00
tr11	Zona terriza C/ Jovellanos, 30	14.187,00
tr12	Zona terriza C/ Antonio Gaudí, 2V	3.899,00
tr13	Zona terriza C/ Catalina San Martin, 2	5.455,00
tr14	Terrizos avenidas del polígono	13.388,00
tr15	Zona terriza C/ Federica Montseny, 1	11.068,00
tr16	Zona terriza C/ Antonio López, 21B	4.750,00
tr17	Zona terriza C/ José Saramago, 2V	14.302,00
tr18	Zona terriza Avda. José Hierro, 90	7.050,00
tr19	Zona terriza Joaquin Sorolla franja metro	5.145,00
tr20	Terrizo Barrio de la Fortuna	3.992,00
tr21	Solar terrizo Avda. las Provincias	2.510,00
tr22	Talud electrodo Joaquin Sorolla	21.086,00
tr23	Zona terriza Avda. La Técnica con C/ Rosendo Mercado	2.166,00
tr24	Terrizos Rivamadrid	6.741,00
tr25	Zona terriza Avda. la Técnica, s/n. Casa Oficios	5.486,00
tr26	Zona terriza entre C/ Electrodo, Avda. de la Técnica y C/ Alcalde Marciano Rivas,	10.643,00
tr27	Zona terriza C/ Alcalde Marciano Rivas, 2.	1.166,00
tr28	Zona terriza C/ Electrodo entre C/ Joaquin Sorolla y Francisco de Quevedo.	4.257,00
tr29	Zona terriza Avda. Aurelio Álvarez, 1. Hotel AC	26.566,00
tr31	Zona terriza Zonas colindantes A3	4.407,00
tr33	Zona terriza franja límite entre C/ Concepción Arenal, 9 y la acera.	2.183,00
tr37	Zona terriza glorietas Terrizas Rivas Futura	130,00
tr39	Zona terriza Rivas Futura	94.209,00
tr41	Terrizo Rivas Futura franjas lateral Hotel AC	2.016,00
tr46	Terrizo campos Casa Grande	5.765,00
tr47	Zona terriza Pueblo frente al metro	3.370,00
tr49	Zona terriza Zonas colindantes A3	90.449,00
tr50	Terrizo al lado Policía Local Jovellanos	6.222,00
tr51	Terrizo bajo Colegio Luyfe	2.983,00
tr52	Terrizo Pol. Ind. Santa Ana	8.334,00
tr53	Terrizo José saramago	3.925,00
tr54	Terrizo bajo campos de futbol Pol. Ind. Santa Ana	62.462,00
tr55	Terrizo José Saramago con Fundación	383,00
tr56	Terrizo lateral I.E.S. Antares	14.189,00
tr60	Zona terriza Protección civil	1.158,00
tr32	Zona terriza Parque Barca Vieja explanada y trasera chalets	24.920,00
tr34	Zona terriza trasera Pilar Bardem (entre cacera y talud)	10.137,00
tr01	Zona terriza C/ Ricardo Zamora sn	2.161,00
tr04	Zona terriza entre calles Cadiz, Jaen y CERPA	3.765,00
tr59	Terrizo metro rivas futura (zona Alfonso)	5.793,00

A las zonas verdes codificadas hay que sumar la totalidad de las calles del callejero del tramo urbano del municipio de Rivas Vaciamadrid.

## ESPECIES VEGETALES EXISTENTES

A continuación se enumeran las especies más habituales y representativas de las zonas verdes incluidas en el alcance del presente Documento de Asesoramiento, ante la imposibilidad de identificar la totalidad:

ESPECIES ARBUSTIVAS	
Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	Juniperus oxicedrus
Berberis thunbergii atropurpurea	Lavandula officinalis
Bignonia grandiflora	Lavandula stoechas
Buddleja davidii	Nerium oleander
Buxus sempervirens	Parthenocissus quinquefolia
Callistemon citrinus	Parthenocissus tricuspidata
Calluna vulgaris	Philadelphus coronarius
Cerastium tomentosum	Phormium tenax
Cistus albidus	Photinia glabra
Cistus clusii	Photinia serrulata
Cistus ladanifer	Photinia x fraseri 'Red Robin'
Cortaderia selloana	Pittosporum tobira
Cotoneaster franchetti	Polygonum aubertii
Cotoneaster horizontalis	Pyracantha coccinea
Cotoneaster lacteus	Retama monosperma
Crataegus monogyna	Retama sphaerocarpa
Cupressocyparis leylandii	Rosa sp.
Cupressocyparis lambertiana	Rosmarinus officinalis
Drosanthemum hispidum	Ruscus aculeatus
Erica arborea	Santolina chamaecyparissus
Erica cinerea	Santolina rosmarinifolia
Euonymus europaeus	Syringa vulgaris
Euonymus japonicus	Tamarix gallica
Forsythia intermedia	Teucrium fruticans
Hedera helix	Thuja orientalis
Hibiscus syriacus	Viburnum tinus
Jasminum fruticans	Vinca major
Jasminum grandiflorum	Vinca minor
Jasminum officinale	Wisteria floribunda
Juniperus comunis	

ESPECIES ARBÓREAS		
<i>Abies alba</i>	<i>Ficus indica</i>	<i>Prunus dulcis</i>
<i>Abies pinsapo</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Prunus pisardii</i>
<i>Acacia dealbata</i>	<i>Gingo biloba</i>	<i>Prunus serrulata</i>
<i>Acer monspessulanum</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	<i>Punica granatum</i>
<i>Acer negundo</i>	<i>Junglas regia</i>	<i>Pyrus communis</i>
<i>Acer platanoides</i>	<i>Lagetroemia indica</i>	<i>Pyrus sp.</i>
<i>Acer sp.</i>	<i>Laurus nobilis</i>	<i>Quercus ilex</i>
<i>Aesculus hippocastanum</i>	<i>Ligustrum japonica</i>	<i>Quercus suber</i>
<i>Allanthus altissima</i>	<i>Liquidambar styraciflua</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>
<i>Albizia julibrissin</i>	<i>Magnolia grandiflora</i>	<i>Salix alba</i>
<i>Arbutus unedo</i>	<i>Malus sp.</i>	<i>Salix babilonica</i>
<i>Broussonetia papyrifera</i>	<i>Melia azederach</i>	<i>Salix matsudana</i>
<i>Catalpa bignoides</i>	<i>Morus alba</i>	<i>Sophora japonica</i>
<i>Cedrus deodara</i>	<i>Morus nigra</i>	<i>Tamarix gallica</i>
<i>Cedrus libanii</i>	<i>Morus sp.</i>	<i>Tilia cordata</i>
<i>Celtis australis</i>	<i>Olea europaea</i>	<i>Tilia platyphyllos</i>
<i>Cercis siliquastrum</i>	<i>Phoenix canariensis</i>	<i>Tilia sp.</i>
<i>Chamaerops humilis</i>	<i>Phoenix latifera</i>	<i>Trachycarpus fortunei</i>
<i>Citrus aurantium</i>	<i>Picea abies</i>	<i>Ulmus minor</i>
<i>Citrus limon</i>	<i>Picea pungens</i>	<i>Ulmus pumila</i>
<i>Citrus reticulata</i>	<i>Pinus halepensis</i>	<i>Ulmus pumila</i>
<i>Citrus sinensis</i>	<i>Pinus pinea</i>	<i>Ulmus umbraculifera</i>
<i>Crataegus laevigata</i>	<i>Platanus hispanica</i>	<i>Yucca sp.</i>
<i>Crataegus monogyna</i>	<i>Populus alba balearica</i>	
<i>Cupressocyparissus leylandii</i>	<i>Populus canadensis</i>	
<i>Cupressus arizonica</i>	<i>Populus deltoides</i>	
<i>Cupressus sempervirens</i>	<i>Populus nigra</i>	
<i>Cydonia oblonga</i>	<i>Populus nigra</i>	
<i>Eleagnus angustifolia</i>	<i>Populus tremula</i>	
<i>Erythraea japonica</i>	<i>Prunus armeniaca</i>	
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	<i>Prunus avium</i>	
<i>Ficus carica</i>	<i>Prunus domestica</i>	

## **DESCRIPCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS**

A continuación, se pasa a describir cada una de las enfermedades y/o plagas susceptibles de estar presentes en las zonas verdes de Rivas Vaciamadrid, en función de las especies existentes, del clima y del suelo.

Se indican los métodos de control existentes hasta el momento, siguiendo la **Gestión Integrada de Plagas**, tal y como se especifica en el RD 1311/2012, de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, priorizando sobre los métodos alternativos al uso tradicional de plaguicidas de origen químico.

Se enumeran las opciones que existen para su control, comenzando por los métodos preventivos, seguido de medidas culturales, biológicas y/o tecnológicas que no necesitan del empleo de productos de origen químico, dejando como última opción los métodos químicos. Dentro de la opción de empleo de productos fitosanitarios de origen químico, se da prioridad a aquellos productos más inocuos y menos agresivos para las personas, fauna y medio ambiente en general. Lo mismo ocurre con los métodos de aplicación. Siempre que sea posible, se priorizará el empleo de técnicas de aplicación más respetuosas con el medio ambiente como por ejemplo la endoterapia.

### **Umbral de intervención.**

Se denomina *umbral de intervención* al grado de perjuicio que estamos dispuestos a admitir antes de llevar a cabo una medida fitosanitaria, ya sea directa o indirecta. Este umbral va a depender de muchos factores, como pueden ser agresividad de la plaga, facilidad de propagación, virulencia, daños ornamentales o perjuicio para los usuarios de las zonas verdes. Pero hay que tener en cuenta los siguientes factores que otorgan un carácter de subjetividad a la definición de los umbrales de intervención:

- No existen umbrales cuantificables, objetivos y unificables para todas las plagas y enfermedades. Para cada caso deberá aplicarse un criterio determinado que marque el umbral.
- El perjuicio estético puede ser suficiente para plantear una intervención fitosanitaria.
- Los agentes que producen efectos urticantes o alérgicos en las personas tienen umbral cero en parques y jardines.

Con todo lo anterior, se proponen los siguientes criterios para valorar si el umbral de intervención ha sido superado:

**Umbral según criterio de vitalidad.** Nivel de daños que supone una reducción considerable en las funciones de la planta. Cuanto mayor sea la afección de la planta, mayores serán las funciones vitales afectadas y por lo tanto su vitalidad.

**Umbral según criterio de funcionalidad/estético.** Cuando se ve afectado el valor ornamental, fin por el que se plantó. A pesar de observar niveles de afección bajos, el estado ornamental se ve afectado negativamente.

**Umbral según criterio de Comodidad.** Cuando los problemas que genera la plaga afectan al uso de las zonas verdes por parte de los ciudadanos. Los usos de la zona no son compatibles con la existencia de insectos.

**Técnicas y sistemas de control.** Se han estructurado en varias fases:

- **Fase 1: Medidas preventivas.** El fin de las medidas preventivas es conseguir que la planta sea lo menos susceptible posible al ataque de patógenos a través de un desarrollo correcto con las mejores condiciones sanitarias. Así, se trata de evitar que se superen los umbrales de intervención a través de un equilibrio ecosistémico. En la mayoría de los casos prevé labores culturales como evitar podas drásticas o mal ejecutadas, favorecer la gestión correcta del riego con aportes de humedad apropiados, suelos bien nutridos, drenajes que eviten encharcamientos, etc.
- **Fase 2: Intervención a través de la Gestión Integrada de Plagas.** En este caso, y siguiendo las indicaciones del RD 1311/2012, se pone en marcha la Gestión Integrada de Plagas, evitando o minimizando el uso de productos fitosanitarios de origen químico. Incluye técnicas alternativas como el monitoreo, empleo de trampas, empleo de productos de origen no químico, etc.
- **Fase 3: Control químico.** Cuando las técnicas anteriores no se han podido aplicar o no han sido lo suficientemente eficaces, se procede al empleo de productos de origen químico, siempre y cuando se haya superado el umbral de intervención.

**Materias activas.** Las materias activas recomendadas en el presente documento están autorizadas a la fecha de la redacción para la especie y la plaga indicada, y no presentan Indicaciones de Peligro en la ficha técnica incompatibles con su uso en el ámbito no agrario, conforme a lo recogido en el Anexo VIII del RD 1311/2012.

**Dosis.** En los apartados de los métodos de control por medio de productos fitosanitarios de origen químico, se indica la materia activa a emplear. Si bien la dosis indicada es representativa o máxima, podrá sufrir variaciones en función de las condiciones específicas del momento de la aplicación.



**Calendario de actuaciones.** En cada apartado se incluye un calendario orientativo que será susceptible de adaptación a cada situación bajo el criterio técnico del aplicador.

**Registro de productos.** Todos los productos fitosanitarios deben estar inscritos en los registros oficiales para poder ser utilizados. La normativa que aplica a estos productos está en continua revisión y examen. Es por ello, que antes de preparar cualquier Plan de Trabajo, debe confirmarse la vigencia del producto en el registro correspondiente.



## 1. PULGÓN



**Orden:** Homópteros

**Familia:** Aphididae

**Nombre científico:** Algunos de los más habituales en zonas verdes: *Aphis catalpae*, *Aphis citricola*, *Aphis craccivora*, *Aphis fabae*, *Aphis gossypii*, *Aphis nerii*, *Aphis spiraecola*, *Aphis viburni*, *Cedrobium laportei*, *Chaitophorus populeti*, *Cinara cedri*, *Hyalopterus pruni*, *Macrosiphoniella samborni*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Macrosiphum rosae*, *Nasonovia ribis-nigris*, *Pterochloroides persicae*, *Tetraneura ulmi*, *Tinocallis saltans*, *Tinocallis kahawaluokalani*, *Toxoptera aurantii*, *Wahlgreniella nervata*.

**Nombre común:** Pulgón

### Descripción:

Pequeños (no más de pocos milímetros), de colores variados, sobre todo verdes, amarillos o negros. Cuerpo ovoidal. Dentro de una misma especie, se encuentran ápteros (sin alas) o alados. Cuerpo blando de forma piriforme. Al final del abdomen los áfidos presentan dos sifones o cornículos, pequeños apéndices erectos de posición dorsal que apuntan hacia atrás o hacia arriba, por los que vierten sustancias u hormonas que repelen a sus depredadores naturales. También producen una secreción azucarada (melaza).

**Afecta a:** múltiples especies, se acompaña listado.

Pulgón	Especie afectada
<i>Aphis catalpae</i>	Catalpa

<i>Aphis craccivora</i>	Retama, Robinia, Hiedra
<i>Aphis fabae</i>	Adelfa
<i>Aphis gossypii</i>	Granado, Pacífico, Eucalipto
<i>Aphis nerii</i>	Adelfa
<i>Aphis viburni</i>	Viburno
<i>Cedrobium laportei</i>	Cedro
<i>Chaitophorus populeti</i>	Chopo
<i>Cinara cedri</i>	Cedro
<i>Hyalopterus pruni</i>	Ciruelo, Pittosporum, Adelfa
<i>Macrosiphum rosae</i>	Rosal
<i>Pterochloroides persicae</i>	Pulgón de la madera del ciruelo
<i>Tetraneura ulmi</i>	Pulgón de las agallas del olmo
<i>Tinocallis saltans</i>	Olmo
<i>Tinocallis kahawaluokalani</i>	Júpiter
<i>Wahlgreniella nervata</i>	Rosal

**Generaciones anuales:** hasta 6 generaciones.

**Síntomas / Daños:**

**Directos**

- Causados al clavar el estilete en los tejidos para alimentarse.
- Absorben la savia de la planta produciendo un debilitamiento generalizado, reducción del crecimiento y amarilleamiento de la planta.

**Indirectos**

- La melaza que segregan abundantemente afecta a: pavimentos, mobiliario urbano, vehículos, personas, etc.

- Cuando el pulgón se alimenta, la savia que no aprovecha sale en forma de melaza que sirve de soporte del hongo fumagina, la cual reduce el proceso de fotosíntesis y le da a la planta un aspecto descuidado y sucio.
- Algunos pueden ser transmisores de virus y otras enfermedades.

### **Umbral de intervención:**

Su gran capacidad de multiplicación y movilidad (adultos alados), así como la importante cantidad de melaza producida, hace aconsejable su tratamiento tras detectar la primera generación. El umbral de intervención es superado por esta plaga siguiendo los criterios de funcionalidad y comodidad. Para superar el umbral de intervención siguiendo el criterio de vitalidad el nivel de infestación debe ser muy alto y continuado en el tiempo.

## **FASE 1. MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO.**

### **Medidas culturales:**

Debe procurarse un buen estado de los árboles y arbustos, realizando un adecuado mantenimiento, evitando podas abusivas, ejecutando un buen calendario anual de abonados, así como una adecuada gestión el riego acorde con las necesidades del árbol o arbusto.

Gracias a la producción de melaza, las hormigas los utilizan como fuente de alimentación. Los áfidos han desarrollado en su evolución una relación simbiótica con hormigas, que no sólo los toleran sobre las plantas, sino que los protegen de sus depredadores, a cambio de la secreción, que les sirven de alimento. Por lo que es necesario el control de las hormigas, evitando que estén suban a los árboles para defenderlos, mediante la colocación de anillos engomados en la zona de subida por tronco y ramas.

## **FASE 2. CUÁNDO ES NECESARIO INTERVENIR. GESTION INTEGRADA DE PLAGAS**

### **Control biológico:**

Los enemigos naturales más conocidos son los depredadores y los parasitoides. En general la suelta de fauna útil, supone un eficaz método de control, que hace innecesaria el uso de otras técnicas.

Son eficaces en el control de pulgones:

**Opción 1º.** *Aphidius colemani*

Himenóptero de la familia Braconidae que actúa como endoparásito de gran número de especies. Es un parásito solitario que desarrolla todos sus estadios larvarios dentro del cuerpo del pulgón.

Las hembras tienen una marcada capacidad de búsqueda, acercándose a las zonas de la planta donde se agregan los pulgones y perforándolos con el ovipositor para depositar un huevo en su interior. Cada individuo es capaz de parasitar a una media de 300 pulgones aproximadamente.

**Opción 2º.** *Aphidoletes aphidimyza*

Díptero de la familia Cecydomyiidae. Es un insecto muy polífago, que ejerce acción de control sobre varias especies pulgones.

En estado adulto se alimenta de la melaza que secretan las colonias de pulgones y son las larvas las que ejercen acción depredadora clavando las mandíbulas a los pulgones e inyectándoles una toxina que los inmoviliza permitiéndoles succionar su contenido.

**Opción 3º.** *Adalia bipunctata*

Coleóptero, endémico de Europa, más conocido como "mariquita de dos puntos", que pertenece a la familia de los coccinélidos.

Este coleóptero se conoce por ser un voraz depredador de gran número de especies de pulgones que afectan tanto a cultivos hortofrutícolas como a ornamentales. Tanto el individuo en estado adulto como el larvario son depredadores de pulgón.

**Opción 4º.** *Chrysoperla carnea*

Neuróptero de la familia Chrysopidae. Los adultos basan su alimentación en néctar, polen, melaza y otros productos azucarados. Mientras que sus tres estadios larvarios presentan una gran capacidad depredadora alimentándose preferentemente de pulgones

Otras opciones más específicas, según la especie de afidio a controlar:

*Aphidius ervi*

Himenóptero de la familia Aphidiidae endoparásito de los pulgones *Macrosiphum euphorbiae* y *Aulacorthum solani*. Las plantas infestadas de pulgones liberan sustancias que *A. ervi* es capaz de detectar a gran distancia, al igual que la melaza que secretan las colonias de pulgón, y que le permite localizar, con eficacia, los puntos de infestación por áfidos, parasitando tanto a los áfidos adultos como a las ninfas.

*Aphelinus abdominalis*

Himenóptero de la familia Aphelinidae, parasitoide de pulgones como *Macrosiphum euphorbiae*, *Macrosiphum rosae* y *Aulacorthum solani*. Posee una elevada capacidad de búsqueda de pulgones y es capaz de parasitarlos en cualquier estado dando lugar a la formación de momias.

**Control tecnológico:**

No se conocen métodos de control tecnológico.

**FASE 3. CUANDO LAS TECNICAS DE GESTION INTEGRADA DE PLAGAS DE LA FASE 2 NO SE PUEDEN APLICAR O NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS. CONTROL QUÍMICO.**

**Justificación del uso de productos fitosanitarios de origen químico.**

Para que los daños causados por el pulgón afecten seriamente el estado fitosanitario del árbol y mermen su vitalidad, deben ser continuados en el tiempo y el nivel de infestación muy elevado, de tal manera que es difícil que el umbral de intervención sea superado siguiendo el criterio de vitalidad. Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, las molestias que ocasiona la melaza pueden producir una gran alarma de los usuarios de las zonas verdes (criterios de funcionalidad y comodidad).

Con el fin de evitar la alarma social y los daños materiales en elementos localizados en la vía pública, se justifica el uso de productos fitosanitarios. A continuación, se propone el método de control que menos afecta al medio ambiente y a las personas, porque la materia activa no entra en contacto ni con el medio ni con las personas:

- Endoterapia en Arbolado (frondosas). Con el fin de minimizar los riesgos para la salud y para el medio ambiente, se aconseja la aplicación de insecticidas de origen químico para combatir la plaga por medio de endoterapia en aquel arbolado que lo permita (mayores de 20cm de perímetro).

Materia Activa: ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V

Dosis: Inyección de 1-2 mm cada 10 cm de perímetro

Plazo de reentrada: no presenta

Compatible con cualquier uso de la zona verde.

**Calendario Aproximado de Actuaciones:**

EN	FB	MR	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	DC

 Endoterapia

 Control biológico

## 2. PROCESIONARIA DEL PINO



**Orden:** *Lepidoptera*

**Familia:** *Thaumetopoeidae*

**Nombre científico:** *Thaumetopoea pityocampa*

**Nombre común:** Procesionaria del pino

**Descripción:**

Mariposa cuyas larvas están cubiertas de pelos urticantes.

Los adultos aparecen en verano. Se reproducen y hacen la puesta el mismo día sobre las acículas de los árboles. Los huevos eclosionan a los 30 días y las larvas comienzan a alimentarse de los brotes. Tienen carácter gregario, formando bolsones en los árboles. Al final del invierno, y tras pasar por cinco estadios larvarios, bajan de los árboles en procesión para enterrarse en el suelo. Al próximo verano aparecerá la nueva generación de adultos, completándose así el ciclo.

**Afecta a:** género *Pinus* y *Cedrus*.

**Generaciones anuales:** 1 generación.

**Síntomas / Daños:**

- Es uno de los mayores defoliadores de pinos y cedros del área mediterránea. Las orugas se alimentan de las acículas, provocando la defoliación del arbolado pudiendo llegar a ser total. El síntoma más evidente es la aparición de los primeros bolsones.
- Supone un grave problema desde el punto de vista de la salud pública, debido a las fuertes alergias que producen los pelos urticantes que poseen sus orugas desde el tercer estadio, con consecuencias potencialmente graves para la salud humana y animal.

### **Umbral de intervención:**

Las orugas producen urticaciones a partir de su segundo estadio a personas y animales, de manera que en parques y jardines se deben llevar a cabo los tratamientos para la supresión de la plaga.

### **FASE 1. MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO. PRÁCTICAS CULTURALES**

La gran movilidad que presenta este insecto y la complejidad de su ciclo biológico hacen que cualquier árbol pueda verse afectado.

Debe procurarse un buen estado de los árboles, realizando un adecuado mantenimiento, evitando podas abusivas, realizando un buen calendario anual de abonados, así como una adecuada gestión del riego acorde con las necesidades del árbol.

Además de unas adecuadas prácticas de mantenimiento, se recomienda la instalación de trampas de captura de adultos. Se utilizarán trampas de feromonas de captura de adultos con el fin de disminuir las poblaciones y de esta manera minimizar el nº de puestas. El monitoreo de las mismas ayudará a elaborar una curva de vuelo que nos permitirá valorar el momento adecuado para llevar a cabo tratamientos fitosanitarios.

### **FASE 2. MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO. LUCHA CONTRA LA LARVA**

#### **Control biológico:**

No se conocen métodos de control biológico.

#### **Control tecnológico:**

La confusión sexual o interrupción de la cópula, es un método de control de plagas eficaz empleado desde hace décadas en agricultura, pero apenas desarrollado en el ámbito forestal. Se fundamenta en saturar el ambiente de feromona femenina a través de su liberación a grandes dosis y por un tiempo prolongado, dificultando el que los machos localicen las hembras y reduciendo así el número de cópulas y por tanto de la población plaga resultante. Si bien esta técnica ofrece resultados muy buenos, no es viable en Rivas al estar rodeado de parque forestal de competencia de la Comunidad de Madrid. Si se aplicase, sería un atrayente a los machos de toda la zona generando un problema, en vez de una solución.

#### **Control con productos fitosanitarios de origen no químico:**



El control preventivo contra la procesionaria se lleva a cabo mediante la nebulización de producto fitosanitario de origen natural a base de BACILLUS THURINGIENSIS var. KURSTAKI.

Se debe respetar una zona mínima de 50 metros alrededor de la zona tratada para evitar que cualquier transeúnte se encuentre expuesto al producto, por lo que su uso, en la práctica está restringido a zonas forestales o periurbanas.

Si hiciese falta una repetición del tratamiento, se dejarán transcurrir al menos 15 días.

Los equipos de pulverización empleados deben estar inscritos en el ROMA, según lo establecido para los equipos de tratamientos fitosanitarios en el RD 1013/2009, de 19 de junio y cumplir con el programa de inspecciones conforme a la resolución de 13 de enero de 2016 de la Dirección General de Agricultura y Ganadería.

### **Control con productos fitosanitarios de origen químico y justificación.**

La procesionaria del pino es una plaga que puede afectar a usuarios de zonas verdes y a sus animales de compañía, produciendo reacciones alérgicas y urticarias. Con el fin de evitar estos incidentes, el uso de productos fitosanitarios de origen químico se justifica en zonas sin acceso a equipos de pulverización de Bacillus o en ejemplares ubicados en zonas consideradas de población vulnerable, siempre y cuando su aplicación se lleve a cabo mediante endoterapia. Esta forma de tratamiento evita cualquier contacto o exposición de personas y animales al producto químico.

Pulverización: Zonas forestales o periurbanas: BACILLUS THURINGIENSIS var. KURSTAKI Dosis: 1,5 - 3,5 l/Ha (volumen de caldo 5 l/Ha)

Endoterapia: VERTIMEC (Abamectina 1,8% [EC] P/V) con nº de registro 16.784

Dosis: Inyección de 1-2mm cada 10cm de perímetro

Plazo de reentrada: no presenta

Compatible con cualquier uso de la zona verde.

### **FASE 3. CUANDO LAS TÉCNICAS DE GESTION INTEGRADA DE PLAGAS DE LA FASE 2 NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS.**

#### **Control mecánico:**

Existen diferentes metodologías de controlar esta plaga complementarias entre sí, como la recogida de orugas con anillos o la retirada manual de bolsones en los árboles. También existe la opción de instalar cajas para murciélagos y aves insectívoras. Pero estas medidas, cuando el



número o el porte de los árboles son elevados, o bien son costosas de llevar a cabo (como en el caso de las 2 primeras), o bien no garantizan un control suficiente como en el caso de los nidales.

**Calendario Aproximado de Actuaciones:**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Colocación de trampas de adultos y medición de curva de vuelo										
	Tratamiento pulverización Bacillus y endoterapia										
	Eliminación de bolsones oruga										

Nota: Este calendario puede verse modificado en función de las características climáticas del año o de los datos de las curvas de vuelo de las mariposas.

### 3. GALERUCA



**Orden:** *Coleóptera*

**Familia:** *Chrysomelidae*

**Nombre científico:** *Xanthogaleruca luteola*

**Nombre común:** Galeruca del olmo

**Descripción:**

La galeruca del olmo ha pasado de ser un insecto con una presencia moderada en nuestros parques y jardines a ser una de las plagas con mayor incidencia en los últimos años y que ha provocado verdaderos problemas fitosanitarios en pueblos y ciudades de buena parte de la península.

Actualmente, los métodos de control de la plaga son muy limitados y además de detallarlos nos gustaría valorar las razones por las que un insecto como la galeruca ha podido llegar a un nivel de plaga realmente alarmante en algunas ciudades. Quizás, lo primero que debemos tener en cuenta son las características propias de este coleóptero y qué favorecen el aumento de la población:

- Pueden desarrollarse hasta 4 generaciones por campaña, podemos encontrarnos con todos los estadios en un mismo momento.
- En el medio natural existen predadores y parásitos; pero no consiguen controlar la plaga y en zonas verdes es complicado gestionar su presencia. Por lo que además no podemos hablar de una estrategia de control biológico para el control de la plaga.
- Gran facilidad de los adultos para invernar (bajo la hojarasca, en las grietas de la corteza, incluso en el interior de las viviendas).
- Relativa movilidad en estado adulto, que le permite buscar nuevos árboles cuando ya han defoliado el arbolado en el que se encuentra.

Estas razones se ven realzadas con los cambios producidos en las condiciones ambientales y en particular el adelanto de la primavera y el retraso de la llegada del otoño. Esto ha propiciado que

los adultos emerjan antes de lo habitual y que dispongan de un periodo de tiempo más amplio para su desarrollo, lo que equivale a un mayor número de generaciones y por lo tanto, a un incremento de la población.

Desde la gestión se ha favorecido la proliferación de la plaga; durante décadas se han realizado pulverizaciones de productos fitosanitarios de amplio espectro de forma indiscriminada, sin limitarse a las zonas afectadas, que han provocado la selección de poblaciones resistentes y el descenso de las especies de fauna auxiliar beneficiosa.

Con la publicación del RD1311/2012, el número de productos químicos fitosanitarios autorizados para el control de la plaga ha ido disminuyendo y en la actualidad solo pueden ser utilizados mediante endoterapia.

En definitiva, todos estos factores han propiciado que la galeruca del olmo se haya convertido en una plaga de primer orden que debemos tener en cuenta en la gestión de nuestros parques y jardines. Pequeño coleóptero de 5-7 mm de color amarillo verdoso que, en primavera, con las primeras brotaciones, los adultos salen de sus refugios donde han pasado el invierno (entre la corteza. Hojarasca, etc.) y comienzan a alimentarse de las hojas. En poco tiempo, se reproducen y la hembra realiza la puesta. La nueva generación de orugas es muy voraz y en pocas semanas completan su ciclo para bajar al suelo y pupar. Los nuevos adultos vuelan a la copa para alimentarse y procrear. A partir de aquí se suceden de 1 a 3 generaciones más, hasta el final del verano. Con la llegada del frío, los adultos se refugian para pasar el invierno hasta la próxima primavera.

### **Síntomas / Daños:**

Larvas y adultos comen hojas provocando defoliación que puede llegar a ser grave. Al tener menor superficie de hoja, la intensidad fotosintética se reduce generando una debilitación general del árbol. Los ejemplares afectados, al quedar debilitados, son susceptibles de ser atacados por otras plagas.

Larvas: Se alimentan del parénquima de la hoja respetando la epidermis del haz.

Adultos: Comen la hoja practicando agujeros completos y reservando los nervios. Los daños más importantes son causados por las larvas

Las larvas y adultos suelen invadir espacios cercanos, portales, ventanas, fachadas causando alarma social y quejas de usuarios

### **Umbral de intervención:**

Para que el umbral de intervención, siguiendo el criterio de vitalidad, sea superado, es necesario que el nivel de la plaga sea muy elevado y continuado en el tiempo. Sin embargo, el gran número

de generaciones anuales, hasta 4, hace necesaria la intervención desde la detección de los primeros síntomas con el fin de evitar efectos mayores y que el nivel de plaga se acumule año tras año. Teniendo en cuenta los criterios de estética y comodidad, el nivel de intervención se supera fácilmente ya que los daños en hojas son muy llamativos, especialmente en estado larvario, y muy molestos para los usuarios de zonas verdes.

## **FASE 1. MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO.**

### **Medidas culturales:**

La gran movilidad de este insecto y la complejidad de su ciclo biológico hacen que, independientemente del buen estado fitosanitario del árbol se vea afectado.

Debe procurarse un buen estado de los árboles, realizando un adecuado mantenimiento, evitando podas abusivas, un buen calendario anual de abonados, así como una adecuada gestión del riego acorde con las necesidades del árbol.

Cuando los niveles de infestación son muy elevados la acumulación de pupas en el suelo puede ser un buen momento para barrerlas, de esta manera estaremos facilitando el descenso de la futura población de adultos, no es un método con el que podamos controlar la plaga, pero nos ayudará a evitar que se agrave. Siempre debemos cerciorarnos de que estén muertas cuando las depositemos en la basura.

## **FASE 2. CUANDO ES NECESARIO INTERVENIR. GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS**

### **Control biológico:**

No se conocen métodos de control biológico, aunque se ha demostrado en estudios recientes en el área metropolitana de Madrid, que la presencia de pulgón reduce la actividad de la galeruca por la presencia de la melaza. Algunas especies de himenópteros, coleópteros y hongos como la *Beauveria globulifera* son especies de control natural de esta plaga. Por lo que podemos considerar medidas que favorezcan la biodiversidad de nuestras zonas verdes para que puedan establecerse los enemigos naturales de esta plaga.

### **Control tecnológico:**

No se conocen métodos de control tecnológico.

**FASE 3. CUANDO LAS TECNICAS DE GESTION INTEGRADA DE PLAGAS DE LA FASE 2 NO SE PUEDEN APLICAR O NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS. CONTROL QUÍMICO.**

**Justificación del uso de productos fitosanitarios de origen químico.**

En estos momentos no existen en el mercado medios alternativos al control químico de la Galeruca del olmo, aunque para producir la muerte del árbol el nivel de infestación debe ser muy alto y continuado en el tiempo; la capacidad que tiene esta plaga para propagarse y su carácter acumulativo año tras año hace necesario su control desde que se observan los primeros síntomas de la misma.

La única opción válida actualmente es:

- Endoterapia. Con el fin de minimizar los riesgos para la salud y para el medio ambiente, se aconseja la aplicación de insecticidas de origen químico para combatir la plaga por medio de endoterapia en aquel arbolado que lo permita (mayores de 20 cm de perímetro).

Materia Activa: ABAMECTINA 1,8%

Dosis: Inyección de 1-2mm cada 10cm de perímetro

Plazo de reentrada: no presenta

Compatible con cualquier uso de la zona verde.

**Calendario Aproximado de Actuaciones:**

EN	FB	MR	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	DC

 Endoterapia

#### 4. **BARRENILLO DEL PINO**



**Orden:** *Coleóptera*

**Familia:** *Scolytidae*

**Nombre científico:** *Tomicus piniperda*

**Nombre común:** Barrenillo o taladro del pino

**Descripción:**

Los *Tomicus* son unos escarabajos de entre 4 y 5 mm de longitud, con élitros marrón rojizo, cabeza y tórax de color negro brillante. Los élitros tienen estrías que están formadas por gruesos puntos espaciados entre sí. En los huecos existentes entre las estrías presentan pilosidades que se distribuyen uniformemente. El protórax está muy desarrollado. Las antenas acaban en maza ovoide. No existe dimorfismo sexual. Las larvas son ápodas, ligeramente curvadas sobre sí mismas con el cuerpo blanquecino y la cabeza de una coloración ocre, llegando a alcanzar los 5 mm de longitud cuando su desarrollo está completado.

La hembra realiza una galería subcortical que tiende a ser recta y paralela al fuste, en la que posteriormente entra el macho para aparearse. El agujero de entrada genera exudaciones resinosas muy características y visibles en la corteza del árbol. La hembra pone entre 40 y 80 huevos a ambos lados de la galería entre los meses de octubre a abril. Entre dos y tres semanas después eclosionan los huevos y las larvas comienzan a alimentarse realizando galerías perpendiculares a la inicial. La duración del ciclo larvario está condicionado por el momento de la puesta y las condiciones climáticas. Al final de su ciclo larvario, crean una cámara de pupación, donde se transforman en adultos. Éstos emergen a través de orificios en la corteza sin resina para dirigirse a la copa donde se alimentan en el interior de los ramillos terminales.

**Afecta a:** Género *Pinus*

### **Generaciones anuales:**

- T. piniperda y minor: 1 generación anual
- T. destruens: hasta 4 generaciones anuales

### **Síntomas / Daños:**

El primer síntoma apreciable son los orificios de entrada con exudaciones resinosas procedentes de las galerías realizadas por la hembra en la corteza. Si eliminamos la corteza, se pueden apreciar las galerías realizadas por las larvas con formas características dependiendo de la especie. En el caso del *piniperda* y *destruens*, en forma de espina de pescado y en el caso del *minor*, en forma de V. Dañan especialmente a los árboles jóvenes y los pies debilitados por otras causas. Las galerías larvarias pueden anillar completamente el tronco y provocar la muerte del árbol. Los daños producidos por los adultos son galerías en los ramillos tiernos, que no causan un verdadero daño.

### **Umbral de intervención:**

Siguiendo el criterio de viabilidad, es superado en el momento en el que se detecta la presencia de la plaga debido a su facilidad de propagación y la dificultad para su control al permanecer la mayoría de los estadios en el interior del árbol.

## **FASE 1. MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO.**

### **Control tecnológico:**

Existen en el mercado trampas específicas para la captura de adultos de la plaga. Éstas pueden ser utilizadas tanto para el monitoreo de la misma como para la captura masiva con el fin de disminuir las poblaciones.

## **FASE 2. CUANDO ES NECESARIO INTERVENIR. GESTIÓN INTERGRADA DE PLAGAS**

### **Control biológico:**

No se conocen métodos de control tecnológico.

### **Medidas culturales:**

Como complemento a los tratamientos químicos, se pueden utilizar árboles cebo en la época anterior al apareamiento (generalmente en el mes de marzo). Se colocan los pies apilados y desramados para luego eliminarlos tras la realización de las puestas. Este método de control es



adecuado para zonas verdes extensivas, donde pueda realizarse la operación y siempre como complemento al químico.

Es muy importante la quema de los pies secos antes de marzo para tratar de frenar el avance de la plaga, puesto que los tratamientos químicos mediante pulverización no son efectivos al tratarse de una plaga que permanece la mayor parte de sus ciclos en el interior del árbol.

**FASE 3. CUANDO LAS TECNICAS DE GESTION INTEGRADA DE PLAGAS DE LA FASE 2 NO SE PUEDEN APLICAR O NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS. CONTROL QUÍMICO.**

**Justificación del uso de productos fitosanitarios de origen químico.**

- Endoterapia. Con el fin de minimizar los riesgos para la salud y para el medio ambiente, se aconseja la aplicación de insecticidas de origen químico para combatir la plaga por medio de endoterapia en aquel arbolado que lo permita (mayores de 20 cm de perímetro).

Materia Activa: ABAMECTINA 1,8%

Dosis: Inyección de 1-2mm cada 10cm de perímetro

Plazo de reentrada: no presenta

Compatible con cualquier uso de la zona verde.

**Calendario Aproximado de Actuaciones:**

EN	FB	MR	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	DC

	Endoterapia
	Árboles cebo
	Trampeo



## 5. PSILA DEL CERCIS



**Orden:** Homópteros

**Familia:** Psyllidae

**Nombre científico:** Cacopsylla pulchella

**Nombre común:** Psila del Cercis

**Descripción:**

Se trata de un pequeño homóptero, las ninfas de los cuales son las causantes de los daños al árbol; chupan la savia de las hojas.

Pasa invierno como huevo o adulto sobre *Cercis siliquastrum*. Los huevos son de color blanco lechoso, volviéndose amarillos a medida que maduran. Al inicio primavera, con la brotación de los árboles (a veces antes, incluso en floración), comienzan a emerger las ninfas prodecentes de los huevos de invierno o bien a recobrar la actividad los adultos, si han pasado el invierno en esta forma, los cuales se reproducen para realizar la puesta. En cualquier caso las ninfas emergentes se desarrollan rápidamente succionando la savia de las hojas, y tras pasar por cinco estadios aparecen los adultos, normalmente desde finales de abril en adelante.

Estado	Tamaño	Características
Larva	3-4 mm	De color verde claro, con los primordios alares semitransparentes y cada vez más evidentes. Producen poca cera pero una importante cantidad de melaza.

Adulto	3-4 mm	Color variable, desde verde amarillento a marrón, con líneas longitudinales anaranjadas en el tórax. Las alas son transparentes con manchas oscuras en la mitad posterior de las anteriores.
--------	--------	--

**Afecta a:** Cercis siliquastrum

**Generaciones anuales:** 1

**Síntomas / Daños:**

**Directos**

Dejan pequeñas heridas que se necrosan, deteriorando las hojas. A diferencia de otras psilas esta especie no enrolla ni deforma las hojas con sus picaduras.

**Indirectos**

- Excretan una sustancia pegajosa que puede ser muy molesta en el ámbito urbano. La melaza que segregan abundantemente afecta a: pavimentos, mobiliario urbano, vehículos, personas, etc.

**Umbral de intervención:**

Normalmente no está justificado un tratamiento, salvo que se vea un debilitamiento importante del árbol.

**FASE 1. MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO.**

**Medidas culturales:**

Los tratamientos, a priori, no están justificados debido a que esta plaga no riza las hojas ni debilita sensiblemente al árbol pero si puede ser conveniente la aplicación de jabones naturales para el lavado de la melaza y de la negrilla.

**FASE 2. CUÁNDO ES NECESARIO INTERVENIR. GESTION INTEGRADA DE PLAGAS**

**Control biológico:**

El principal depredador de esta psila es el chinche antocórido *Anthocoris nemoralis*, del cual se han realizado sueltas artificiales en el mes de mayo por parte de algunos ayuntamientos con muy buenos resultados.

**Control tecnológico:**

No se conocen métodos de control tecnológico.

**FASE 3. CUANDO LAS TECNICAS DE GESTION INTEGRADA DE PLAGAS DE LA FASE 2 NO SE PUEDEN APLICAR O NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS. CONTROL QUÍMICO.**

**Justificación del uso de productos fitosanitarios de origen químico.**

Existe una opción interesante a base de inyecciones al tronco (endoterapia), pero sólo está justificado en plagas fuera de control que ponen en riesgo la viabilidad del ejemplar o en aquéllos que, por su ubicación, la melaza desprendida es causa de molestia.

**PRODUCTOS FITOSANITARIOS A UTILIZAR EN EL TRATAMIENTO.**

VERTIMEC (Abamectina 1,8% [EC] P/V) con nº de registro 16.784

**Calendario Aproximado de Actuaciones:**

EN	FB	MR	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	DC

	Control biológico
	Endoterapia

## 6. TIGRE DEL PLÁTANO



**Orden:** *Hemiptera*

**Familia:** *Tingidae*

**Nombre científico:** *Corythuca ciliata*

**Nombre común:** Tigre del plátano

**Descripción:**

Los insectos adultos pasan el invierno bajo las cortezas de los árboles e introducidos en las resquebrajaduras de los troncos. Es en primavera cuando abandonan sus refugios invernales y se dirigen a las ramas que tienen las primeras hojas. Allí se sitúan en el envés de las hojas, siempre próximos a las nervaduras principales y comienzan sus picaduras. Después de 10-15 días, las hembras realizan las puestas, también en la superficie del envés de las hojas.

Los huevos eclosionan naciendo las pequeñas larvas de aspecto diferente a los adultos y de color oscuro con manchas negras brillantes. Estas formas juveniles pasan por cuatro estados evolutivos hasta llegar a la forma adulta tras 30-35 días. De esta forma se producen generaciones solapadas hasta finales de otoño. Hacia finales de agosto o principios de septiembre, momento en el que se producen cambios térmicos importantes, los insectos se desplazan a los troncos y especialmente a su base para protegerse y pasar el invierno.

**Afecta a:** Género *Platanus*, *Fraxinus* y *Tilia*

**Generaciones anuales:** 3 generaciones

### **Síntomas / Daños:**

Estos síntomas pican las hojas de los plátanos destruyendo el parénquima foliar, produciendo la decoloración y amarilleo de las hojas alrededor de la nerviación. Los ataques provocan debilitamiento y pérdida de vigor y en ocasiones, puede llegar a producir defoliaciones.

En árboles atacados es fácil distinguir las picaduras, los exuvios larvales, las deyecciones y la melaza brillante que segrega estos insectos. También es común que se establezcan hongos del grupo de las fumaginas sobre las hojas atacadas.

### **Umbral de intervención:**

El aspecto que presentan los árboles atacados por esta plaga no es bueno, ya que los exuvios, deyecciones y melazas son muy visibles, las hojas amarillean y pueden derivar en el ataque de otros patógenos como las fumaginas. Por otro lado, al no realizar el tratamiento aseguramos la presencia de la plaga para la próxima temporada y probablemente de forma más virulenta. Por todo ello, se aconseja realizar los tratamientos en el momento que presenciemos que los adultos hibernantes pasan a ocupar las hojas.

## **FASE 1. MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO.**

### **Medidas culturales:**

La complejidad de su ciclo biológico hace que, independientemente del buen estado fitosanitario del árbol, éste se vea afectado. A pesar de ello, se debe procurar un buen estado fitosanitario del arbolado, manteniendo una buena estructura (evitar podas abusivas), realizar un buen calendario de abonado orgánico y adecuando el riego a las necesidades reales.

## **FASE 2. CUANDO ES NECESARIO INTERVENIR. GESTIÓN INTERGRADA DE PLAGAS**

### **Control biológico:**

Sueltas primaverales de *Anthocoris nemoralis*, heteróptero de la familia Anthocoridae, depredador muy voraz en todos los estadios móviles. Se nutre activamente, depredando huevos, adultos y estados ninfales.

### **Control tecnológico:**

No se conocen

**FASE 3. CUANDO LAS TECNICAS DE GESTION INTEGRADA DE PLAGAS DE LA FASE 2 NO SE PUEDEN APLICAR O NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS. CONTROL QUÍMICO.**

**Justificación del uso de productos fitosanitarios de origen químico.**

En aquellos casos en los que el nivel de infestación es elevado, con el fin de evitar que al año siguiente se reproduzca la plaga de forma más virulenta, se justifica el uso de productos fitosanitarios de origen químico.

- Endoterapia. Con el fin de minimizar los riesgos para la salud y para el medio ambiente, se aconseja la aplicación de insecticidas de origen químico para combatir la plaga por medio de endoterapia en aquel arbolado que lo permita (mayores de 20 cm de perímetro).

Materia Activa: ABAMECTINA 1,8%

Dosis: Inyección de 1-2mm cada 10cm de perímetro

Plazo de reentrada: no presenta

Compatible con cualquier uso de la zona verde.

**Calendario Aproximado de Actuaciones:**

EN	FB	MR	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	DC

	Endoterapia
	Control biológico



## 7. ORUGA PERFORADORA DE LOS CHOPOS



**Orden:** *Lepidoptera*

**Familia:** *Sesiidae*

**Nombre científico:** *Sesia apiformis*

**Nombre común:** Oruga perforadora del chopo

**Descripción:**

El aspecto de los adultos es similar al de una avispa, distinguiéndose con facilidad por tener el abdomen en prolongación con el tórax, y por las antenas, que son negras, bipectinadas y con un mechón de pelos amarillos en la base. Las larvas pueden llegar a medir hasta 55 mm de longitud en su último estadio. Son de color blanco marfil y la cabeza de color marrón claro con la frente en forma de corazón. En su último segmento presenta un gancho quitinoso arqueado hacia delante.

La hembra realiza la puesta en la base de los árboles o sobre las raíces que estén próximas a su base. Depositará entre 1500 y 2000 huevos en varios días. Las orugas se introducen en las grietas de la corteza donde comienzan a alimentarse del cambium. Realizan galerías siempre descendentes que van aumentando de diámetro según lo hace el tamaño de las larvas. Las larvas

pasan así el invierno y, a mediados del mes de octubre o principios de noviembre, realizarán un capullo en el interior del tronco.

**Afecta a:** Géneros Populus, Alnus y Salix

**Generaciones anuales:** 3 generaciones

### **Síntomas / Daños:**

Este insecto afecta fundamentalmente a la formación de los árboles. Las galerías que efectúan las orugas provocan una rotura de los conductos de savia y por tanto un debilitamiento de los pies afectados dando lugar, en muchas ocasiones, a que se produzca una rotura mecánica de los mismos por la acción del viento. Incluso puede provocar la muerte del árbol. Estos ataques favorecen la entrada de hongos y bacterias.

### **Umbral de intervención:**

La presencia de la plaga y la dificultad para su control hacen necesaria la intervención desde la detección de los primeros sistemas de presencia de la misma con el fin de evitar efectos mayores.

Esta plaga puede ocasionar roturas de ramas e incluso la muerte del árbol superando el umbral siguiendo el criterio de vitalidad desde los primeros síntomas.

## **FASE 1. MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO.**

### **Medidas culturales:**

Los árboles jóvenes pueden verse más afectados por esta plaga por lo que se recomienda una mayor vigilancia de los mismos y en particular del arbolado de nuevas plantaciones. Deben examinarse detalladamente los troncos. En caso de detectarse presencia de plaga, debe procederse a eliminar y quemar los ejemplares afectados. En caso de ejemplares pequeños con diámetros < 30 cm, afectados, es aconsejable su arranque y destrucción.

Los árboles deben mantener un adecuado nivel de nutrición y de riego para lo cual es necesario realizar aportes de abono orgánico y realizar una adecuada gestión del riego.

En cuanto a la poda, debe limitarse a la poda de formación en etapas jóvenes procurando realizar cortes del menor diámetro posible. Los restos de poda deben ser retirados y eliminados.

Eliminar partes afectadas, preferentemente cuando la oruga esté en su interior.



## FASE 2. CUANDO ES NECESARIO INTERVENIR. GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS

### Control biológico:

No se conocen

### Control tecnológico:

No garantizan el control total

## FASE 3. CUANDO LAS TECNICAS DE GESTION INTEGRADA DE PLAGAS DE LA FASE 2 NO SE PUEDEN APLICAR O NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS. CONTROL QUÍMICO.

### Justificación del uso de productos fitosanitarios de origen químico.

La inexistencia en el mercado de productos o trampas que garanticen el control total de la plaga y la gran gravedad de los daños que puede ocasionar hace necesario el uso de productos fitosanitarios de origen químico para controlar y evitar la propagación.

- Endoterapia. Con el fin de minimizar los riesgos para la salud y para el medio ambiente, se aconseja la aplicación de insecticidas de origen químico para combatir la plaga por medio de endoterapia en aquel arbolado que lo permita (mayores de 20 cm de perímetro).

Materia Activa: ABAMECTINA 1,8%

Dosis: Inyección de 1-2mm cada 10cm de perímetro

Plazo de reentrada: no presenta

Compatible con cualquier uso de la zona verde.

### Calendario Aproximado de Actuaciones:

EN	FB	MR	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	DC

Endoterapia

## 8. ESCOLÍTIDO DEL OLMO



**Orden:** *Coleóptera*

**Familia:** *Scolytidae*

**Nombre científico:** *Scolytus scolytus*

**Nombre común:** Barrenillo, taladro

### **Descripción:**

Coleóptero de la familia de los escolítidos, subcortical y productor de galerías que pueden debilitar e incluso matar los olmos más jóvenes, aunque su mayor riesgo es ser vector de la grafiosis del olmo (*Ceratocystis ulmi*).

Se trata de un pequeño coleóptero de tan sólo 4-6 mm de longitud, que se instala sobre las yemas más tiernas, las muerde y araña irreversiblemente.

La hembra pone los huevos entre la corteza y el tronco, formando galerías. Tras pasar la etapa de pupa, los insectos adultos vuelan hacia otros árboles transportando las esporas de hongos infectando otros ejemplares.

Se supone que el vuelo no sobrepasa los 3 km motivo por el que la distancia supone un freno geográfico a la proliferación.

**Afecta a:** Géneros *Ulmus* y *Prunus*

**Generaciones anuales:** Puede presentar hasta 4 generaciones anuales

### **Síntomas / Daños:**

Practica galerías (se aprecian los orificios de entrada) en los brotes tiernos, ramas y tronco, por donde el árbol excreta goma, debilitándolo. Cuando el nivel de infestación es elevado y, sobre todo, en arbolado joven, puede ocasionar la muerte del ejemplar.

Esta plaga ataca primero los ejemplares poco vigorosos y/o enfermos, secándolos. Por el contrario, un árbol no podado y correctamente abonado, será menos propenso a sufrir las consecuencias de un ataque de escolítidos al ser más vigoroso.

### **Umbral de intervención:**

La presencia de la plaga y la dificultad para su control hacen necesaria la intervención desde la detección de los primeros sistemas de presencia de la misma con el fin de evitar efectos mayores.

El umbral de intervención, siguiendo criterios de vitalidad, es superado en arbolado joven desde la detección de los primeros síntomas.

## **FASE 1. MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO.**

### **Medidas culturales:**

En el caso de nuevas plantaciones, deben examinarse detalladamente los troncos. En el caso de detectar orificios o plaga, se debe proceder a eliminar y quemar los ejemplares afectados. En el caso de ejemplares pequeños con diámetro < 15 cm afectados, es aconsejable su arranque y destrucción.

Los árboles deben mantener un adecuado nivel de nutrición y riego, para lo cual es necesario realizar aportes de abono orgánico y realizar una adecuada gestión de riego.

En cuanto a la poda, debe limitarse en la medida de lo posible a las podas de formación en las etapas más jóvenes, procurando cortes lo menos agresivos posibles. Las podas drásticas debilitan el árbol favoreciendo el ataque del barrenillo, al tiempo que abre grandes heridas que facilitan la entrada del coleóptero.

Conviene podar las ramas secas y eliminarlas, al igual que las ramas donde se aprecien síntomas de afección para evitar la propagación. Si es el tronco el que aparece afectado, deben ser arrancados.

### **Control biológico:**

No se conocen

## **FASE 2. CUANDO ES NECESARIO INTERVENIR. GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS**

### **Control tecnológico:**

Existen en el mercado trampas específicas para la captura de adultos. Pueden emplearse tanto para el monitoreo como para la captura masiva.

**FASE 3. CUANDO LAS TECNICAS DE GESTION INTEGRADA DE PLAGAS DE LA FASE 2 NO SE PUEDEN APLICAR O NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS. CONTROL QUÍMICO.**

**Justificación del uso de productos fitosanitarios de origen químico.**

La inexistencia en el mercado de productos o trampas que garanticen el control total de la plaga y la gran gravedad de los daños que puede ocasionar hace necesario el uso de productos fitosanitarios de origen químico para controlar y evitar la propagación.

- Endoterapia. Con el fin de minimizar los riesgos para la salud y para el medio ambiente, se aconseja la aplicación de insecticidas de origen químico para combatir la plaga por medio de endoterapia en aquel arbolado que lo permita (mayores de 20 cm de perímetro).

Materia Activa: ABAMECTINA 1,8%

Dosis: Inyección de 1-2mm cada 10cm de perímetro

Plazo de reentrada: no presenta

Compatible con cualquier uso de la zona verde.

**Calendario Aproximado de Actuaciones:**

EN	FB	MR	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	DC

Endoterapia

## 9. ARAÑA ROJA



**Orden:** *Prostigmata*

**Familia:** *Tetranychidae*

**Nombre científico:** *Tetranychus urticae*

**Nombre común:** Araña roja

**Descripción:**

Los machos son de forma aplanada con largas patas, mientras que las hembras son más esféricas. La coloración es variable: rojo anaranjado (hembra) o amarillento (macho) dependiendo del sexo, ambos con los ojos rojos. Presentan dos manchas dorsales laterales oscuras en el interior del cuerpo que se observan mejor en los individuos de color claro. En sus estados inmaduros presentan la misma forma, aunque inicialmente con 3 pares de patas en lugar de 4, y el cuerpo con una coloración más pálida.

**Afecta a:** Múltiples géneros, tanto de arbolado como de especies arbustivas

**Generaciones anuales:** múltiples, de 5 a 8 generaciones

**Síntomas / Daños:**

En hojas, producen decoloración a causa de las picaduras que terminan por desecar la zona afectada. Ataques intensos pueden llegar a provocar que la planta pierda las hojas de manera prematura, sobre todo si sopla viento seco. En algunas plantas, como los cítricos, se producen abultamientos amarillos en las hojas.

A simple vista se observan como pequeños puntos rojizos localizados en el envés de las hojas formando colonias protegidas por hilos de seda.

### **Umbral de intervención:**

Tanto los enemigos naturales como la lluvia suelen mantener un equilibrio tolerable en la población de araña roja. En ocasiones, cuando las condiciones son favorables, pueden sufrir un aumento desmesurado, siendo entonces necesario realizar un tratamiento específico para lo que será necesario realizar una monitorización de las poblaciones con el fin de conocer la evolución e intervenir cuando se encuentren afectados por encima del 15% de las hojas.

### **FASE 1. MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO.**

#### **Medidas culturales:**

No se conocen, más allá de intentar mantener las plantas en un buen estado de salud, nutridas e hidratadas.

### **FASE 2. CUANDO ES NECESARIO INTERVENIR. GESTIÓN INTERGRADA DE PLAGAS**

#### **Control biológico:**

La araña roja es un ácaro fitófago generalista que provoca serios daños en numerosos cultivos hortícolas.

El control biológico es posible gracias a la actividad depredadora de sus enemigos naturales como son los ácaros fitoseidos (*Amblyseius* y *Noseiulus*), las chinches antocórido (Género *Orius*) y miridos (*Macrolophus*).

*Phytoseilus persimilis* es el enemigo natural más conocido y empleado en el control de la araña roja. En España es muy abundante en la costa mediterránea y en Canarias. Es el depredador más habitual para el control de la araña roja porque sólo se alimenta de ella.

*Amblyseius californicus* es una especie propia de las regiones de clima mediterráneo y es capaz de sobrevivir a base de otras presas y de recursos vegetales variados (néctar, polen, etc), por lo que puede estar presente antes de que llegue la plaga (como control preventivo). Sobrevive a ambientes secos.

#### **Control tecnológico:**

No se conocen

**FASE 3. CUANDO LAS TECNICAS DE GESTION INTEGRADA DE PLAGAS DE LA FASE 2 NO SE PUEDEN APLICAR O NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS. CONTROL QUÍMICO.**

**Justificación del uso de productos fitosanitarios de origen químico.**

El empleo de productos fitosanitarios de origen químico sólo está justificado cuando el nivel de infestación es muy elevado y pone en riesgo la vitalidad del ejemplar afectado.

- Endoterapia. Con el fin de minimizar los riesgos para la salud y para el medio ambiente, se aconseja la aplicación de insecticidas de origen químico para combatir la plaga por medio de endoterapia en aquel arbolado que lo permita (mayores de 20 cm de perímetro).

Materia Activa: ABAMECTINA 1,8%

Dosis: Inyección de 1-2mm cada 10cm de perímetro

Plazo de reentrada: no presenta

Compatible con cualquier uso de la zona verde.

**Calendario Aproximado de Actuaciones:**

EN	FB	MR	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	DC

	Endoterapia
	Control biológico

## 10. ORUGA DEFOLIADORA DEL ATRIPLEX

**Orden:** *Lepidoptera*

**Familia:** *Noctuidae*

### **Descripción:**

Son una familia de robustas mariposas nocturnas, con más de 26.000 especies conocidas. Muchas tienen mucha pelusa grisácea, aunque las hay con brillantes tonalidades en las alas. Generalmente hay pocas diferencias entre sexos. La inmensa mayoría de los noctuidos vuelan de noche y son invariablemente atraídos por los focos de luz. A muchos les atrae el azúcar y las flores ricas en néctar.

Muchas especies tienen larvas oruga que viven en el suelo y resultan ser plagas de la agricultura y la horticultura.

Forman pupas brillantes y duras. Muchas larvas de noctuidos comen de noche, descansando en el suelo o en cavidades de las plantas que comen durante el día.

**Afecta a:** Género *Atriplex*

**Generaciones anuales:** 1-2

### **Síntomas / Daños:**

Pasa el invierno como larva en el suelo dentro de un capullo terroso. En primavera reinicia la actividad, alimentándose por la noche y enterrada en el suelo a unos 2 cm de la superficie durante el día. Cuando la oruga completa todos sus estadios, se entierra a una profundidad de 20 cm para pupar.

Los adultos aparecen en verano y se reproducen en los meses de otoño. La hembra deposita los huevos sobre el envés de las hojas del cultivo, en malas hierbas o directamente en el suelo.

### **Umbral de intervención:**

Teniendo en cuenta los daños que provocan y la voracidad de sus ataques, es conveniente tratar de manera preventiva en aquellas zonas que hayan tenido infestaciones anteriores

## **FASE 1. MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO.**

### **Medidas culturales:**

No se conocen, más allá de intentar mantener las plantas en un buen estado de salud, nutridas e hidratadas.



## **FASE 2. CUANDO ES NECESARIO INTERVENIR. GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS**

### **Control biológico:**

No se conocen

### **Control tecnológico:**

No se conocen

## **FASE 3. CUANDO LAS TECNICAS DE GESTION INTEGRADA DE PLAGAS DE LA FASE 2 NO SE PUEDEN APLICAR O NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS. CONTROL QUÍMICO.**

### **Justificación del uso de productos fitosanitarios de origen químico.**

No hay productos autorizados

## 11. XYLELLA FASTIDIOSA



*Xylella fastidiosa* es una bacteria Gram negativa, crónica vascular y limitada al xilema. Fue descrita por primera vez en California en 1892.

Tiene más de 300 hospedantes tanto en monocotiledóneas como en dicotiledóneas. Produce graves daños en cultivos muy importantes en nuestro país, tales como cítricos, vid, almendros, melocotoneros, así como en numerosas especies ornamentales. Su presencia en las plantas es la responsable de diversas enfermedades de importancia económica para la producción agrícola: clorosis variegada de los cítricos, enfermedad de Pierce en la vid, Phony Peach en melocotonero, enanismo de la alfalfa y el quemado de hojas en otras especies leñosas.

Es uno de los principales patógenos de cuarentena en la Unión Europea, por lo que está incluida en la Directiva 2000/29/CE (traspuesta a la legislación nacional en el RD 58/2005).

*Xylella fastidiosa* es transmitida por varios géneros de cicadélidos, que toman la bacteria al alimentarse del xilema y lo transmiten por el mismo sistema. La multiplicación de la bacteria se da en el xilema.

Actualmente se encuentran en la lista A1 de la EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization), tanto la bacteria como sus vectores *Draeculacephala minerva*, *Graphocephala atropunctata*, *Homalodisca vitripennis* (= *H. coagulata*) y *Xyphon fulgidum*.

La colonización de la bacteria en la planta, es frecuentemente asintomática en muchos huéspedes por un largo periodo de tiempo desde la inoculación, lo que dificulta la detección. No necesariamente resulta siempre en desarrollo de enfermedad. Asimismo hay diferencias significantes en cuanto a la susceptibilidad entre los diferentes huéspedes a los que afecta.

**Afecta a:** más de 100 plantas hospedadores diferentes. En muchas de ellas no provoca daños aparentes, y pueden actuar como reservorios de la bacteria. Los principales cultivos afectados son

principalmente leñosos, y entre ellos destacan vid, cítricos, almendro, melocotonero, café y adelfa, aunque muchos otros son también susceptibles en distinta medida, entre ellos peral, ciruelo, aguacate, arándano, y distintos árboles ornamentales como plátano de sombra, robles, olmos, arces, liquidámbar, etc.

### **Síntomas / Daños:**

X. fastidiosa invade el xilema de la planta hospedadora. Su multiplicación en el interior de los vasos puede llevar a la obstrucción del flujo de savia bruta, principalmente agua y sales minerales. Los síntomas varían de unos hospedadores a otros. En algunos se corresponden con los síntomas típicos de estrés hídrico: marchitez o decaimiento generalizado y, en casos más agudos, la seca de hojas y ramas, y finalmente la muerte de toda la planta. En otros casos los síntomas se corresponden más a los provocados por ciertas deficiencias de minerales, como clorosis internervial o moteado en hojas.

### **FASE 1. MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO. PRÁCTICAS CULTURALES**

La principal medida de control fitosanitario debe ser extremar las precauciones en cuanto al comercio del material vegetal sensible y especialmente el procedente de zonas con presencia de la bacteria. Este material vegetal debe proceder siempre de productores oficialmente autorizados y con pasaporte fitosanitario en su caso. En estos momentos y por proximidad del foco detectado en Italia, debe cuidarse especialmente el origen y el estado fitosanitario de material vegetal sensible procedente de ese país. En cualquier caso, es fundamental comunicar inmediatamente a las autoridades de sanidad vegetal cualquier sospecha de la presencia de esta bacteria en nuestra comunidad.

### **FASE 2. CUANDO LAS PRÁCTICAS CULTURALES PREVENTIVAS DE LA FASE 2 NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS.**

Una vez detectado un foco en el campo, los tratamientos químicos contra la bacteria o sus vectores no suelen ser efectivos. En estos casos es necesaria la eliminación de los árboles afectados y la vegetación silvestre circundante que pueda actuar como hospedadora de la bacteria, así como establecer un programa de vigilancia en años sucesivos para intentar evitar el rebrote de la enfermedad.

### **VALORACIÓN DE LOS RIESGOS INHERENTES AL TRATAMIENTO.**

N.A.

## 12. BACTERIOSIS ELEAGNUS



**Nombre común:** Bacteriosis

### **Descripción:**

Se produce cuando los microorganismos fermentan la savia en las grietas u otras heridas de la corteza o en la región cambial. El flujo que produce esta fermentación es ácido y de aspecto como una espuma blanca; emite un olor fermentativo muy desagradable, aunque suele persistir solo un corto tiempo durante el verano. Los microorganismos aparentemente producen gas y etanol. Según los ejemplares estudiados con este flujo, se suele producir en árboles estresados por algún motivo. Suele estar asociado a la presencia de lesiones en el sistema radicular o en tronco y ramas.

**Afecta a:** Eleagnus

**Síntomas / Daños:** decaimiento generalizado de la copa con las hojas algo decoloridas y de un tamaño inferior a lo normal. Debilitamiento. Olor producido molesto para los usuarios de las zonas verdes.

### **Umbral de intervención:**

En el momento de apreciar debilitamiento de la copa conviene eliminar el ejemplar y proceder a la quema de sus restos.

### **FASE 1. MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO. PRÁCTICAS CULTURALES**

Esta afección está íntimamente relacionada con el estado sanitario del árbol, asociado a ejemplares que sufren estrés y/o lesiones. Por ello es importante mantener el arbolado en buen estado de

nutrición e hidratación, aplicando abonados conforme a calendario y llevando a cabo una correcta gestión de riegos.

**FASE 2. CUANDO LAS TÉCNICAS DE GESTION INTEGRADA DE PLAGAS DE LA FASE 2 NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS.**

Eliminación de pies afectados y quema de restos para evitar la propagación

### **13. CHINCHE DEL PLÁTANO**



**Orden:** *Hemíptera*

**Familia:** *Orsillidae*

**Nombre científico:** *Belonochilus numenius*

**Nombre común:** Chinche del plátano

**Descripción:**

Chinche de unos 7 mm de longitud, fitófago (aparato succionador largo y fino), que crece en los frutos de los plátanos de sombra y se alimenta de ellos.

Estudios recientes desarrollados en Pennsylvania, permitieron describir el ciclo de vida, de huevo al quinto estadio, al igual que el diagnóstico del segundo al cuarto estadio (Wheeler, 1984). Hibernan en estado de huevo en las semillas de los frutos, principalmente en los caídos en el suelo. Tan solo un porcentaje bajo de individuos de la primera generación se desarrollan en los frutos que quedan en la copa. El número de individuos por fruto, tanto en estado adulto como ninfa, oscila entre 0 y 50 (media 15/fruto). La eclosión de los huevos comienza durante la primera mitad del mes de abril, hasta comienzos de mayo. Las eclosiones más tempranas se mantienen protegidas dentro de los frutos. Los primeros adultos aparecen alrededor del 20 de mayo, y la puesta tiene lugar en los frutos de la temporada actual, aunque raramente también se pueden dar en frutos viejos que permanecen en el árbol, pero nunca en los frutos caídos. El apareamiento y la puesta de la primera generación dura hasta el 10 de junio, solapándose con todos los estados ninfales de la segunda generación. A 20°C bajo fotoperiodo natural, el periodo ninfal requiere una media de 28,8 días. A mediados de octubre, la especie ha desarrollado 4 generaciones. Los huevos puestos por la tercera y cuarta generación de hembras representan el estado hibernante. Los adultos se pueden

encontrar bajo la corteza desde otoño hasta comienzos de la primavera, lo que sugiere que los adultos hibernantes podrían encontrarse en zonas más meridionales y cálidas (Wheeler, 1984).

**Afecta a:** Platanus (planta huésped en Europa, Platanus × hispánica)

**Generaciones anuales:** 4 generaciones.

**Síntomas / Daños:**

- No se han documentado daños en el árbol. Se considera plaga por las molestias que genera en zona urbana

**Umbral de intervención:**

Dadas las molestias que genera al entrar en las viviendas, se sugiere considerar la detección de la plaga como umbral de tratamiento.

**FASE 1. MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO. PRÁCTICAS CULTURALES**

La gran movilidad que presenta este insecto y la complejidad de su ciclo biológico hacen que cualquier árbol pueda verse afectado.

Debe procurarse un buen estado de los árboles, realizando un adecuado mantenimiento, evitando podas abusivas, realizando un buen calendario anual de abonados, así como una adecuada gestión del riego acorde con las necesidades del árbol.

**FASE 2. MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO.**

**Control biológico:**

No se conocen métodos de control biológico.

**Control con productos fitosanitarios de origen no químico:**

No se conocen

**FASE 3. CUANDO LAS TÉCNICAS DE GESTION INTEGRADA DE PLAGAS DE LA FASE 2 NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS.**

**Control con productos fitosanitarios de origen químico y justificación.**

- Endoterapia en Arbolado. Con el fin de minimizar los riesgos para la salud y para el medio ambiente, se aconseja la aplicación de insecticidas de origen químico para combatir la



plaga por medio de endoterapia en aquel arbolado que lo permita (mayores de 20cm de perímetro).

Materia Activa: ABAMECTINA 1,8%

Dosis: Inyección de 1-2mm cada 10cm de perímetro

Plazo de reentrada: no presenta

Compatible con cualquier uso de la zona verde.

Existen en el mercado otras materias activas como el DELTAMETRIN, que se aplica en pulverización, pero no se recomienda porque no compensa el daño que genera sobre la fauna auxiliar en comparación con los daños que genera la plaga.

#### **Calendario Aproximado de Actuaciones:**

El tratamiento de endoterapia se puede aplicar en cualquier época del año teniendo en cuenta que se solapan las generaciones. Tan sólo tener en cuenta las épocas de mayor movimiento de savia del árbol que facilite la traslocación del producto.



## 14. COCHINILLA ALGODONOSA



**Orden:** *Hemiptera*

**Familia:** *Coccoidea*

**Nombre científico:** *Planococcus citri*

**Nombre común:** Cochinilla algodonosa

**Descripción:**

De forma ovalada y color amarillento, cubierto de una secreción algodonosa cerosa blanca, está rodeada de 18 pares de filamentos céreos, pudiendo ser el par posterior más largo que el resto.

**Afecta a:** Citrus, Cedrus, Cupressus, Pinus, Quercus, Ligustrum, Prunus, Melia, Ulmus, Olea, Cotoneaster, Eleagnus, Hedera, Juniperus, Nerium, Phormium, Pyracantha, Thuya, Robinia y Pittosporum

**Generaciones anuales:** Hasta 6 generaciones.

**Síntomas / Daños:**

Es una plaga muy perjudicial. Las cochinillas algodonosas adultas y sus larvas chupan la savia de las plantas hospedantes, mermando el crecimiento vegetal. Excretan una sustancia rica en azúcares (melaza) sobre la que proliferan colonias de fumaginas que ennegrecen la planta y le restan vistosidad. A menudo va asociado a una fuerte defoliación.

**Umbral de intervención:**

El gran número de generaciones anuales y su carácter polífago, hace necesaria la intervención desde los primeros síntomas de presencia de la misma, con el fin de evitar efectos mayores y la

proliferación de otros patógenos. Esta plaga puede superar el nivel de intervención siguiendo los tres criterios marcados anteriormente, ya que además de afectar al uso de las zonas y mermar la estética de la planta, puede dañar su vitalidad.

## **FASE 1. MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO.**

### **Medidas culturales:**

Debe procurarse un buen estado de los árboles y arbustos, realizando un adecuado mantenimiento, evitando podas abusivas, ejecutando un buen calendario anual de abonados así como una adecuada gestión de riegos, acorde con las necesidades de la planta.

## **FASE 2. CUANDO ES NECESARIO INTERVENIR. GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS**

### **Control biológico:**

Existen dos depredadores naturales de la cochinilla:

Opción 1 – *Anagyrus pseudococci*, himenóptero de la familia Encyrtidae. Actúa específicamente sobre la cochinilla. Las hembras actúan parasitando los estados larvarios de la cochinilla. LA pupa parasitada se endurece y se hincha hasta que el adulto emerge por un orificio de la parte posterior.

Opción 2- *Cryptolaemus montrouzieri*, coleóptero de la familia Coccinelidae. Depredador de distintas especies de cochinillas. Es un insecto capaz de alimentarse de todos los estados de desarrollo de la cochinilla.

### **Control tecnológico:**

No se conocen métodos de control tecnológico.

## **FASE 3. CUANDO LAS TECNICAS DE GESTION INTEGRADA DE PLAGAS DE LA FASE 2 NO SE PUEDEN APLICAR O NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS. CONTROL QUÍMICO.**

### **Justificación del uso de productos fitosanitarios de origen químico.**

Opción 1 - Endoterapia. Con el fin de minimizar los riesgos para la salud y para el medio ambiente, se aconseja la aplicación de insecticidas de origen químico para combatir la plaga por medio de endoterapia en aquel arbolado que lo permita (mayores de 20 cm de perímetro).

Materia Activa: ABAMECTINA 1,8%

Dosis: Inyección de 1-2mm cada 10cm de perímetro

Plazo de reentrada: no presenta

Compatible con cualquier uso de la zona verde.

Opción 2- Pulverización con ACEITE DE PARAFINA 83% ( ) [EC] P/V. Se trata de un insecticida de contacto que no genera resistencias e impide el buen funcionamiento del sistema respiratorio por obstrucción de los orificios de entrada del aire. Válido para ornamentales leñosas.

Dosis: 1-1,5%. Evitar acceso de terceras personas a la zona de tratamiento durante la pulverización. No presenta plazo de reentrada. Requiere repetición a los 15 días del tratamiento debido al gran número de generaciones anuales y a la gran resistencia por su morfología.

**Calendario Aproximado de Actuaciones:**

EN	FB	MR	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	DC

	Endoterapia
	Pulverización
	Control biológico

**PRODUCTOS FITOSANITARIOS A UTILIZAR EN EL TRATAMIENTO.**

VERTIMEC (Abamectina 1,8% [EC] P/V) con nº de registro 16.784

## 15. ORUGA DE LA RETAMA



**Orden:** *Lepidóptero*

**Familia:** *Pyralidae*

**Nombre científico:** *Uresiphita gilvata*

**Nombre común:** Oruga de la retama

### **Descripción:**

En reposo, los adultos de *Uresiphita gilvata* adoptan forma triangular con las alas anteriores tapando las posteriores. Las alas anteriores son escamosas, de color marrón con un posible matiz cobrizo, con bandas transversales y algunas manchas oscuras circulares cerca del margen. Este patrón de las alas es críptico y poco constante, por tanto no es fácil identificar al adulto. Las alas posteriores, que quedan escondidas en reposo, son disruptivas; tienen un borde marrón y el centro ocre o anaranjado. En la cabeza destacan los ojos esféricos, grandes, laterales, del mismo color que las alas, y la espiritrompa que agudiza el vértice. Las patas son mucho más claras que el cuerpo y las alas.

Las orugas tejen nidos sedosos sobre la planta de la que se nutren. Las orugas poseen franjas longitudinales de colores: el dorso es azul turquesa, debajo hay una franja negra y después una amarilla. En los laterales hay también espiráculos negros de los que salen pelos largos y blancos. Estas orugas son devoradoras voraces.

En otoño pueden verse tanto adultos como orugas, aunque son mucho más características y fáciles de observar las orugas de colores vivos y hábitat fijo que no las mariposas solitarias, crípticas y de vuelo preferentemente nocturno. *Uresiphita gilvata* se distribuye por toda Europa.

**Afecta a:** Retama de olor (*Spartium junceum*) u otros arbustos genistoideos (*Genista*, *Cytissus* y *Ulex*)

### **Síntomas / Daños:**

La oruga se alimenta de las hojas de las retamas debilitándolas y provocando la muerte de la planta.

### **Umbral de intervención:**

Dada su facilidad de propagación, es necesario tratar tan pronto como se detecte.

### **FASE 1. MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO.**

#### **Control biológico:**

No se conocen métodos de control biológico.

### **FASE 2. CUANDO LAS TÉCNICAS DE GESTION INTEGRADA DE PLAGAS DE LA FASE 1 NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS.**

#### **Control con productos fitosanitarios de origen químico y justificación.**

BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V (insecticida) - 0,05 - 0,08 %. Sin plazo de seguridad. No presenta Indicaciones de peligro incompatibles para su uso en ámbito distinto al agrario. Válido tanto para ornamentales herbáceas como leñosas.

#### **Calendario Aproximado de Actuaciones:**

- Tratamiento con Betaciflutrin: con la aparición de la oruga

## 16. FUEGO BACTERIANO



**Orden:** *Enterobacteriales*

**Familia:** *Enterobacteriaceae*

**Nombre científico:** *Erwinia amylovora*

**Nombre común:** Fuego bacteriano

### **Descripción:**

La bacteria provoca el secado de las inflorescencias, decaimiento y muerte de brotes y ramas, pudiendo llegar a afectar a ramas gruesas y troncos formando chancros. Las flores, frutos y hojas ya secos permanecen en la planta. Los brotes se curvan de una forma característica denominada "cayado de pastor". En la zona de avance de la enfermedad y en el interior de la planta, los tejidos adquieren un color marrón-rojizo difuso y característico.

**Afecta a:** múltiples especies de la familia de las rosáceas: Carategus, Pyracantha, Cotoneaster, Amelanchier, Photinia o Erybotria

### **Umbral de intervención:**

Es una de las enfermedades más graves que afecta a rosáceas por su agresividad y facilidad de propagación y no existen métodos de control eficaces por lo que el umbral de intervención es superado en cuanto se aprecian los primeros síntomas de la enfermedad, siguiendo el criterio de vitalidad.

## **FASE 1. MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO.**

### **Medidas culturales:**

Debe procurarse un buen estado de los árboles y arbustos realizando un adecuado mantenimiento, evitando podas abusivas, ejecutando un buen calendario anual de abonos así como una adecuada gestión de riegos.

Para evitar la propagación de la enfermedad es importante extremar las precauciones relativas a la limpieza y desinfección de las herramientas de poda y recorte.

## **FASE 2. CUANDO LAS TÉCNICAS DE GESTION INTEGRADA DE PLAGAS DE LA FASE 1 NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS.**

Está considerada como organismo nocivo en cuarentena en la Unión Europea. En caso de detectarse la enfermedad, se procederá a la eliminación (quema) de los ejemplares afectados.

### **Control biológico:**

- No se conocen métodos de control biológico.

### **Control tecnológico:**

- No se conocen métodos de control tecnológico.

## **FASE 3. CUANDO LAS TECNICAS DE GESTION INTEGRADA DE PLAGAS DE LA FASE 2 NO SE PUEDEN APLICAR O NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS. CONTROL QUÍMICO.**

### **Justificación del uso de productos fitosanitarios de origen químico.**

#### **Control químico:**

- No existen productos químicos autorizados para planta ornamental por las indicaciones de peligro, conforme al Anexo VIII del RD 1311/2012

### **Calendario Aproximado de Actuaciones:**

N.A.



## 17. FITÓFTORA



**Orden:** *Peronosporales*

**Familia:** *Pythiaceae*

**Nombre científico:** *Phytophthora sp.*

**Nombre común:** Fitóftora

### **Descripción:**

La enfermedad suele introducirse mediante plantas infectadas. Se disemina por el flujo de agua del suelo o de riego y, por tanto, está asociada a condiciones de suelo húmedas; el exceso de agua o los suelos de alta capacidad de retención favorecen la propagación.

La actividad parasitaria del hongo es máxima entre 10-20°C, coincidiendo con la primavera y se frena durante el verano.

**Afecta a:** múltiples especies de arbolado y arbustos: Acer, Cupressus, Taxus, Rododendro, Thuya y Cupresocyparis.

### **Síntomas/Daños:**

A medida que avanza la primavera aparecen los primeros síntomas en hojas que inicialmente presentan amarilleamiento entre los nervios, volviéndose totalmente amarillas después. El sistema radicular de las plantas afectadas apenas presenta pelos absorbentes y, cuando la enfermedad llega a las raíces principales, éstas mueren vegetando hasta que comienza a subir la temperatura; entonces, el sistema radicular no es capaz de alimentar a la parte aérea y ésta muere de repente. Si la enfermedad no está muy extendida, algunos rebrotes sobreviven y no vuelven a mostrar síntomas durante todo el verano. Cuando el suelo está muy infectado. También mueren los rebrotes y rodales enteros se quedan sin plantas.



### **Umbral de intervención:**

La virulencia de la enfermedad, su difícil control y los graves daños que ocasionan a los vegetales afectados hace que el umbral de intervención siguiendo el criterio de vitalidad sea superado en cuanto se detectan los primeros síntomas de la misma.

## **FASE 1. MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO.**

### **Medidas culturales:**

Las medidas preventivas como método de control de la enfermedad son las más efectivas ya que, una vez infectado el suelo, es realmente difícil controlar la enfermedad y evitar su propagación.

La enfermedad está directamente relacionada con la existencia en el suelo de un exceso de agua y con suelos con alto contenido de nitrógeno. Por ello, es importante llevar a cabo una buena gestión del riego y evitar suelos encharcados.

Deben emplearse abonados con bajo contenido en nitrógeno y se prestará especial atención al cuidado limpieza y desinfección de herramientas de recorte y poda para evitar la propagación a través de esporas.

## **FASE 2. CUANDO LAS TÉCNICAS DE GESTION INTEGRADA DE PLAGAS DE LA FASE 1 NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS.**

### **Control biológico:**

- No se conocen métodos de control biológico.

### **Control tecnológico:**

- No se conocen métodos de control tecnológico.

## **FASE 3. CUANDO LAS TÉCNICAS DE GESTION INTEGRADA DE PLAGAS DE LA FASE 2 NO SE PUEDEN APLICAR O NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS. CONTROL QUÍMICO.**

### **Justificación del uso de productos fitosanitarios de origen químico.**

### **Control químico:**

- No existen productos químicos autorizados para planta ornamental por las indicaciones de peligro, conforme al Anexo VIII del RD 1311/2012.

## 18. ROYA



**Orden:** *Pucciniales*

**Familia:** *Phragmidiaceae*

**Nombre científico:** *Phragmidium mucronatum*

**Nombre común:** Roya

**Descripción:**

Se reconoce fácilmente ya que las plantas infestadas presentan manchas de color amarillento en el haz de las hojas y abultamientos con esporas amarillentas en el envés, progresivamente, a medida que avanza el invierno van oscureciendo y producen la caída prematura de las mismas. Los tallos afectados poseen callosidades y presentan un debilitamiento evidente.

**Afecta a:** rosales

**Síntomas/Daños:**

Debilitamiento y pérdida de vigor. En ocasiones puede llegar a provocar defoliaciones.

**Umbral de intervención:**

Su gran capacidad de propagación hace que sea necesario su control en cuanto se localicen las primeras infestaciones.

### **FASE 1. MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO.**

**Medidas culturales:**

Con el fin de disminuir los riesgos de infección, se debe realizar una buena planificación antes de la plantación eligiendo marcos de plantación apropiados para favorecer la ventilación.

En los macizos existentes es conveniente adecuar el marco de plantación en el caso de plantas muy juntas. Se deben eliminar las hojas caídas y se debe planificar bien el riego evitando excesos de humedad y encharcamientos. Asimismo, la aplicación de abonos foliares en la época de crecimiento aumentará el vigor de la planta.

**FASE 2. CUANDO LAS TÉCNICAS DE GESTION INTEGRADA DE PLAGAS DE LA FASE 1 NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS.**

**Control biológico:**

- No se conocen métodos de control biológico.

**Control tecnológico:**

- No se conocen métodos de control tecnológico.

**FASE 3. CUANDO LAS TECNICAS DE GESTION INTEGRADA DE PLAGAS DE LA FASE 2 NO SE PUEDEN APLICAR O NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS. CONTROL QUÍMICO.**

**Justificación del uso de productos fitosanitarios de origen químico.**

**Control químico:**

- Pulverización (tanto ornamentales herbáceas como leñosas) con MICLOBUTANIL 2,5% [AL] P/V. Dosis: pulverización foliar directa sin diluir. Plazo de reentrada: No existe.
- Pulverización con HIDROXIDO CUPRICO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P. Dosis: 0,15 - 0,5%. Aire libre: Dosis máxima por tratamiento uso profesional: 1,5-2 kg/ha. Fecha de caducidad: 31/05/2021

**Calendario aproximado:**

EN	FB	MR	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	DC

 Pulverización

## 19. ANTRACNOSIS DEL PLÁTANO



**Orden:** *Diapothales*

**Familia:** *Valsaceae*

**Nombre científico:** *Apiognomonía veneta*

**Nombre común:** Antracnosis del plátano

### **Descripción:**

El hongo sobrevive en el árbol, en restos de materia orgánica, en las semillas como micelio. El ciclo se inicia en primavera, durante los periodos de lluvia con la producción de ascosporas (inóculo primario) que son descargadas desde sus fructificaciones y dispersadas por el viento y agua hacia las hojas jóvenes. Las ascosporas germinan y penetran en el hospedante. Luego, sobre las áreas infectadas se diferencian los conidios en fructificaciones acervulares. Durante el tiempo húmedo, estas esporas pueden observarse a través de la superficie foliar "rajada". Los conidios también son diseminados por el viento y el agua de lluvia y, de este modo, dispersan de la enfermedad.

**Afecta a:** *Platanus*

### **Síntomas/Daños:**

Los síntomas de la enfermedad se presentan en las hojas como manchas ocre oscuras con borde indefinido que pueden resquebrajar la lámina. Estas lesiones se desarrollan principalmente a lo largo de la nervadura principal y las venas secundarias, ya sea en su unión con el peciolo o en el margen de la lámina. Si las lesiones se inician en los extremos de las nervaduras, el margen de las hojas se torna de color café claro, tonalidad similar a los efectos de las quemaduras por calor. El patógeno pasa el periodo invernal como micelio protegido en las ramas atacadas o en las yemas o bien como peritecio en las hojas que quedan en el suelo. Los conidios diseminan la enfermedad durante el periodo vegetativo de la planta hospedante. El principal daño lo provoca sobre las hojas y ramillos jóvenes, dando lugar a una defoliación que se traduce en una disminución del crecimiento así como una importante depreciación del valor estético del árbol. Los árboles muy

afectados terminan por morir lentamente, transcurridos 4 ó 5 años desde el inicio de la enfermedad.

### **Umbral de intervención:**

Esta enfermedad puede causar la muerte a medio plazo del arbolado afectado, así como la depreciación del valor estético de los mismos. Por ello, se debe comenzar a tratar desde el momento en que se detecten los primeros síntomas.

## **FASE 1. MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO.**

### **Medidas culturales:**

Podas sanitarias con el fin de eliminar ramas secas y afectadas ya que son la fuente del inóculo responsable de las infecciones en la estación en curso y la siguiente. Los restos de poda deben quemarse.

## **FASE 2. CUANDO LAS TÉCNICAS DE GESTION INTEGRADA DE PLAGAS DE LA FASE 1 NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS.**

### **Medidas culturales:**

Con el fin de evitar la propagación del hongo, se realizará una poda no agresiva de las zonas afectadas, limitando la concentración de inóculo. Escrupulosa limpieza y desinfección de herramientas de poda.

### **Control biológico:**

- No se conocen métodos de control biológico.

### **Control tecnológico:**

- No se conocen métodos de control tecnológico.

## **FASE 3. CUANDO LAS TÉCNICAS DE GESTION INTEGRADA DE PLAGAS DE LA FASE 2 NO SE PUEDEN APLICAR O NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS. CONTROL QUÍMICO.**

### **Justificación del uso de productos fitosanitarios de origen químico.**

No existen en el mercado tratamientos de origen NO químico

### **Control químico:**

Opción 1: Pulverización con OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V. Dosis: 02 l/ha. Vol. de caldo: 500-1000 l/ha. Fecha de caducidad: 18/12/2029

**Calendario aproximado:**

EN	FB	MR	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	DC

 Pulverización

## 20. OIDIO



**Orden:** *Erysiphales*

**Familia:** *Erysiphaceae*

**Nombre científico:** Algunas de las especies más habituales en zonas verdes son: *Erysiphe polygoni*, *E. polyhaga*, *E. cichoracarum*, *E. communis*, *E. lagestroemiae*, *Oidium spp.*, *Microsphaera sp.*, *M. begoniae*, *Sphaeroteca fuliginea*.

**Nombre común:** Oídio

### **Descripción:**

Hongo fácilmente reconocible ya que las plantas infestadas presentan un polvo blanquecino compuesto por esporas y micelios en crecimiento. El micelio sobrevive en invierno sobre las yemas, en la corteza de las ramas y brotes y sobre la hojarasca del suelo. En primavera se inicia un nuevo ciclo infectivo. Necesita tejido vivo para su desarrollo y por tanto, los nuevos brotes primaverales son los más adecuados. Las esporas son diseminadas por el viento a nuevas plantas.

**Afecta a:** Múltiples géneros, tanto de arbolado como de especies arbustivas, aunque generalmente afecta más a las especies arbustivas. Las especies más afectadas son Catalpa, Platanus, Ulmus, Prunus, Lagestroemia, Magnolia, Rosa, Viburnum, Euonymus, Hedera, Buxus, Laurus y Ligustrum.

### **Síntomas / Daños:**

La infestación provoca debilitamiento y pérdida de vigor y, en ocasiones, puede llegar a producir defoliaciones. Pero el problema principal de la presencia de oidio en zonas verdes se debe a la pérdida del valor ornamental de las plantas.

### **Umbral de intervención:**

Para que esta afección comprometa la vida de la planta, el nivel de infestación debe ser muy elevado y continuado en el tiempo de tal manera que en sus primeros niveles, el umbral de intervención, siguiendo el criterio de vitalidad, no es superado. A pesar de ello, la fácil propagación de la enfermedad con el viento y herramientas de poda, y su difícil control cuando las condiciones ambientales le son favorables, hace necesario poner en marcha las medidas de control en cuanto se detecta la enfermedad. Si tenemos en cuenta el criterio estético, el nivel de intervención es superado en cuanto aparecen los primeros síntomas de la enfermedad ya que el hongo desmerece el estado de la zona verde.

### **FASE 1. MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO.**

#### **Medidas culturales:**

Debe procurarse un buen estado de los árboles y arbustos realizando un adecuado mantenimiento, evitando podas abusivas, ejecutando un buen calendario anual de abonos así como una adecuada gestión de riegos.

Las condiciones que favorecen la propagación de la enfermedad con las siguientes: temperaturas moderadas, sombra y humedad. Por lo tanto, en este caso es muy importante actuar desde el diseño evitando las especies más susceptibles en zonas umbrías.

Para evitar la propagación de la enfermedad es importante extremar las precauciones relativas a la limpieza y desinfección de las herramientas de poda y recorte.

### **FASE 2. CUANDO ES NECESARIO INTERVENIR. GESTIÓN INTERGRADA DE PLAGAS**

#### **Control biológico:**

No se conocen

#### **Control tecnológico:**

No se conocen



**FASE 3. CUANDO LAS TECNICAS DE GESTION INTEGRADA DE PLAGAS DE LA FASE 2 NO SE PUEDEN APLICAR O NO HAN CONSEGUIDO SUS OBJETIVOS. CONTROL QUÍMICO.**

**Justificación del uso de productos fitosanitarios de origen químico.**

**Control químico:**

Fumigación con MICLOBUTANIL 2,5% [EW] P/V Dosis: 0,3 l/hl. Efectuar máximo 2 aplicaciones con un volumen de caldo entre 500-1.000 l/Ha.

Fecha caducidad: 31/05/2022

**Calendario Aproximado de Actuaciones:**

Fumigación al comienzo de la floración

## **CONDICIONAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS EN ZONAS VERDES.**

Los productos fitosanitarios que se pueden utilizar por usuarios profesionales en estas zonas, deben estar registrados en el registro oficial, estar específicamente autorizados para el tratamiento en la especie a tratar y para la plaga que se pretende combatir, cumplir los requisitos especificados en el anexo VIII del RD1311/2012 con respecto a las indicaciones de peligrosidad y, en el caso de productos en cuyas fichas especifique el ámbito de aplicación. Estar autorizados para el uso en parques y jardines.

El usuario profesional o empresa contratada, deberá solicitar autorización municipal para la realización del tratamiento, a la que se debe adjuntar:

- Documento de asesoramiento
- Plan de trabajo conforme al Anexo X "Contenido del Plan de Trabajo para usos no agrarios" del RD 1311/2012

Es necesario avisar a los vecinos por parte del Ayuntamiento o quien delegue, indicando:

- Lugar, fecha y hora de la realización del tratamiento
- Tipo de tratamiento que se va a realizar
- Identificación de los productos a emplear

En los espacios utilizados por el público en general, el responsable de la aplicación deberá:

- Adoptar las medidas necesarias para evitar que se produzca el acceso a terceros el tiempo suficiente para garantizar el plazo de seguridad (reentrada)
- En la medida de lo posible, realizar los tratamientos en horarios en los que la presencia de terceros sea improbable, salvo que se trate de jardines cercados o que sea posible establecer una barrera señalizada que advierta al público de la prohibición del acceso al área señalada.

En los espacios utilizados por grupos vulnerables, se requiere la información al director o responsable del centro con 48 horas de antelación para dar la oportunidad de proponer una modificación si viese incompatibilidad con la actividad del centro.

Como excepción, en los contratos privados, los interesados están eximidos de enviar el registro de los tratamientos realizados sin perjuicio de la obligación de conservar los contratos de tratamientos que realicen.

Los equipos de tratamientos fitosanitarios automotrices arrastrados o suspendidos que se empleen exclusivamente en el ámbito profesional deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA).

Con el fin de evitar aplicaciones deficientes, dosificaciones inadecuadas y vertidos accidentales, la maquinaria de aplicación se mantendrá en perfecto estado de mantenimiento y revisión.

Con el fin de evitar sobrantes al finalizar la jornada, se realizará un cálculo preciso del caldo necesario para la aplicación del día. Si a pesar de ello existieran sobrantes, se tomarán las medidas necesarias para que, en la eliminación de los restos de la mezcla que quede, y tras la posterior limpieza de los depósitos, no se ponga en peligro la salud humana y el medio ambiente. Así,

- Se prohíbe el vertido de los restos de mezcla excedentes del tratamiento. Si fuera necesario, se eliminarán estos restos mediante las instalaciones o dispositivos preparados para eliminar o degradar los residuos de los productos fitosanitarios.
- En ningún caso se pueden lavar los equipos a distancias inferiores a 50 metros de masas de agua superficial y/o de pozos.
- Los equipos de tratamientos se mantendrán resguardados de la lluvia.

Se evitará llenar los depósitos de los equipos de aplicación directamente desde pozos o puntos de almacenamiento de agua, ni desde un cauce, excepto en el caso de que se utilicen equipos con dispositivos anti-retorno o cuando el punto de captación esté más alto que la boca de llenado.

Cuando se apliquen productos fitosanitarios en las inmediaciones de masas superficiales de agua, se respetará una banda de seguridad mínima de 5 m con respecto a la misma, sin perjuicio de que deba dejarse una banda mayor cuando así se establezca en la autorización o figure en la etiqueta del producto fitosanitario.

Los puntos de agua susceptibles de contaminación por productos fitosanitarios deberán cubrirse de forma que se evite la contaminación puntual, al menos durante la realización de los tratamientos.

Las operaciones de regulación y comprobación del equipo de tratamiento se realizarán previamente a la mezcla y carga del producto fitosanitario, y al menos a 25 m de los puntos de masas de agua susceptibles de contaminación.

Hay que identificar los pozos y las masas de agua superficial utilizadas para la extracción de agua para consumo humano que puedan estar afectadas directamente por el tratamiento, de cara a estar en disposición de tomar medidas para evitar su contaminación por el uso de fitosanitarios.

Se dejará como mínimo una distancia de 50 m sin tratar con respecto a los puntos de extracción de agua para consumo humano en las masas de agua superficial, así como en los pozos utilizados para tal fin.

Salvo en aquellos casos en los que los envases estén adscritos a un sistema de depósitos, devolución y retorno, los envases y restos de producto deben ser gestionados tal y como se recoge en el art. 51 Gestión de los envases vacíos y restos de productos para usos no agrarios.

En el caso de endoterapia, no es necesario informar a los vecinos de la realización del tratamiento fitosanitario. No obstante, se publicará en la web de la empresa el calendario de tratamientos, a título informativo.

No es necesario adoptar medidas para evitar que se produzca el acceso de terceros, ni durante la ejecución de los tratamientos ni con posterioridad.

No es necesario realizar los tratamientos en horarios en que la presencia de terceros sea improbable.

No es necesario tomar medidas especiales de precaución durante la realización de los tratamientos con respecto a los puntos de agua susceptibles de contaminación por productos fitosanitarios, tales como los pozos situados en la parcela tratada.

No es necesario identificar los pozos y las masas de agua superficial utilizadas para extracción de agua para consumo humano al no estar afectados por el tratamiento.

Como se indica en el artículo 47, del RD1311/2012, de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, queda prohibida, con carácter general para todas las clases de usuarios, la utilización de productos fitosanitarios, bajo condiciones distintas a las que se establecen en el presente Real Decreto, sin perjuicio de las establecidas en la autorización de cada producto fitosanitario.

## **EXISTENCIA DE GRUPOS VULNERABLES.**

El RD 1311/2012 especifica cuáles son los espacios utilizados por grupos vulnerables: jardines existentes dentro o en las inmediaciones de colegios y guarderías infantiles, campos de juegos infantiles, centros de asistencia sanitaria, incluidas residencias para ancianos y centros deportivos. Además, se especifica que, en los espacios utilizados por grupos vulnerables, además de cumplir con las especificaciones indicadas en el apartado 11, se requiere conocimiento previo del director del centro afectado para que pueda tomar las medidas preventivas que considere necesarias. El director del centro, con la menos 48 horas previas al tratamiento, podrá proponer justificadamente una fecha u hora más apropiada. Por lo tanto, la empresa aplicadora, en el Plan de Trabajo, deberá hacer constar la existencia de grupos vulnerables en las zonas verdes a tratar o en sus inmediaciones.

Los espacios vulnerables se pueden clasificar de la siguiente manera:

- Centro de Salud
- Centro y residencias de la tercera edad
- Colegios de educación secundaria
- Centros de Ed. Infantil y Primaria
- Escuelas infantiles
- Centros deportivos
- Parques de juegos infantiles

Se prestará especial atención en la buena ejecución del tratamiento en aquellos espacios utilizados por grupos vulnerables que se encuentren al aire libre (pistas de barrio y parques de juego infantiles).

## **PRESENCIA DE CURSOS DE AGUA Y DE POZOS**

El RD 1311/2012 indica una serie de medidas a seguir con el fin de proteger el medio acuático.

### **Priorización de productos fitosanitarios para evitar la contaminación de las aguas**

Cuando sea apreciable un riesgo de contaminación de las aguas, se dará prioridad a la utilización de productos fitosanitarios no clasificados como peligrosos para el medio acuático.

También se dará prioridad a aquellas técnicas de aplicación más eficientes, como el uso de equipos de aplicación de baja deriva y métodos de aplicación como la endoterapia, que evita que el producto fitosanitario entre en contacto con el medio ambiente.

### **Medidas para evitar la contaminación difusa de las masas de agua**

- Cuando se apliquen productos fitosanitarios, se tomarán las medidas necesarias para evitar la contaminación difusa de las masas de agua, recurriendo en la medida de lo posible a técnicas que permitan prevenir dicha contaminación y reduciendo también, en la medida de lo posible, las aplicaciones en superficies muy permeables.
- Cuando se apliquen productos fitosanitarios se respetará una banda de seguridad mínima de 5 m con las masas de agua superficial, sin perjuicio de que deba dejarse una banda mayor cuando así se establezca en la autorización y figure en la etiqueta del producto fitosanitario utilizado.
- Se evitarán todo tipo de tratamientos con vientos superiores a 3 m/s (=10,8 km/h)

### **Medidas para evitar la contaminación puntual de las masas de agua**

Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar la contaminación puntual de las masas de agua, teniendo en cualquier caso carácter obligatorio las siguientes prácticas:

- No llenar los depósitos de los equipos de aplicación directamente desde los pozos o puntos de almacenamiento de agua, ni desde un cauce de agua, excepto en el caso de que se utilicen equipos con dispositivos antirretorno o cuando el punto de captación está más alto que la boca de llenado del depósito.
- Los puntos de agua susceptibles de contaminación por productos fitosanitarios, tales como los pozos situados en la parcela tratada, deberán cubrirse de forma que se evite la contaminación puntual, al menos durante la realización de los tratamientos.

- Se evitará realizar tratamientos sobre las zonas que no sean objetivo del mismo; particularmente se interrumpirá la pulverización en los giros.
- Las operaciones de regulación y comprobación del equipo de tratamiento se realizarán previamente a la mezcla y carga del producto fitosanitario, y al menos a 25 m de los puntos y masas de agua susceptibles de contaminación.

### **Medidas específicas para evitar la contaminación en zonas de extracción de agua para consumo humano.**

Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar la contaminación en zonas de extracción de agua para consumo humano, teniendo en cualquier caso carácter obligatorio las siguientes prácticas.

- El gestor de las zonas verdes, así como cualquier otra persona o empresa que requiera tratamientos con productos fitosanitarios para uso profesional, identificará los pozos y las masas de agua superficial utilizadas para extracción de agua para consumo humano que puedan estar afectadas directamente por el tratamiento, de cara a estar en disposición de tomar medidas para evitar su contaminación por el uso de productos fitosanitarios. En su caso hará la correspondiente anotación en el registro de tratamientos.
- Se dejará como mínimo, una distancia de 50 m sin tratar con respecto a los puntos de extracción de agua para consumo humano en las masas de agua superficiales, así como en los pozos utilizados para tal fin.

En el término municipal de Rivas Vaciamadrid existen varios parajes con protección medioambiental que hay que tener en cuenta en el caso de tratamientos fitosanitarios cercanos: Parque Regional del Sureste y Espacios protegidos Red Natura 2.000



## **VALORACIÓN DE LOS RIESGOS INHERENTES A LOS TRATAMIENTOS**

**Deriva.** Deben tomarse todas las medidas necesarias para minimizar la deriva de los productos al tiempo que se hace que el tratamiento sea eficaz. Esto se logra aplicando un tamaño de gota adecuado. No se deben hacer aplicaciones con vientos de más de 3 m/s. Se empleará una boquilla adecuada aplicando la presión conveniente para conseguir un tamaño de gota eficiente de forma que se consiga una distribución uniforme del producto, evitando el goteo de las hojas e intentando minimizar el volumen de caldo necesario.

**Lixiviación.** Se evitarán los riesgos de lixiviación haciendo una aplicación adecuada evitando el goteo de producto para las hojas y se vierta caldo sobre el suelo.

**Escorrentía.** En el momento de la carga del equipo y la elaboración del caldo se tomarán medidas para evitar vertidos. Asimismo se presta especial atención durante el tratamiento para evitar derrames accidentales o vertidos por posibles averías o rutas de la máquina de aplicación.

**Riesgos para masas de agua.** Se evitarán los riesgos de contaminación e las masas de agua cumpliendo todo lo indicado en los capítulos anteriores.


## **MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA LOS OPERARIOS**

- El operario aplicador deberá disponer de la formación adecuada que se justificará con la posesión del carnet de aplicador de nivel básico. El responsable del tratamiento deberá disponer del carnet de nivel cualificado.
- Deben leerse con atención las indicaciones de las etiquetas de los envases, así como las frases R/S del Registro del Ministerio.
- La apertura y manipulación de los productos fitosanitarios deberá realizarse al aire libre o en locales muy ventilados.
- Deberán emplearse adecuadamente todas las indicaciones recibidas por parte de la Técnico de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto a equipos de protección, tanto individuales como colectivas.
- La maquinaria se mantendrá revisada y en perfecto estado, haciendo especial hincapié en el correcto estado de las boquillas de pulverización.
- No comer ni fumar durante la aplicación
- Finalizado el tratamiento, lavarse bien las manos con agua y jabón especialmente las manos, brazos y cara.
- Revisar normas internas

## **NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE**

- Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal
- RD 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios
- Ley 11/1997, de envases y residuos de envases
- Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental
- Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Modificada por Ley/50/1998, Ley 39/1999, RD 5/2000 y Ley 54/2003
- RD 3349/83. Reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas, modificado por RD 162/91
- RD 2115/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- RD 13/2009, de 19 de junio, sobre caracterización y registro de maquinaria agrícola
- RD 1702/2011, de 18 de noviembre, inspección periódica de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios.
- RD 347/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

En Rivas Vaciamadrid, a 20 de abril de 2021



Fdo. Érica Valiente Oriol  
Técnico Asesor en Gestión de Plagas  
Nº Inscripción ROPO: 132800450SA